3. மணிக்கட்டின் ரேடியல் தமனியின் மேல் பெருவிரலைத்த விரமற்ற 3 விரல்களை வைக்க வேண்டும்.

4. நாடித்துடிப்பை நன்கு உணர்ந்து நாடித்துடிப்பின் வலிமையையும், சீரான துடிப்பையும் உணர வேண்டும்.

5. பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டரையோ அல்லது வினாடிகள் காட்டக்கூடிய கடிகாரத்தையோ பயன்படுத்தி ஒரு நிமிடத்திற்கு நாடித்துடிப்பை எண்ண வேண்டும். தேவைப்படுமாயின் சரியாகவும், உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் திரும்பவும் எண்ண வேண்டும்.

6. நாடித்துடிப்பின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் வலிமையில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை குறிப்பேட்டில் குறிக்க வேண்டும். பொதுவான TPR அட்டவணையில் சிவப்பு பேனாவால் நாடித்துடிப்பு குறிப்பிட வேண்டும்.



5.7 சுவாசம்

சுவாசம் என்பது காற்று உள்ளிழுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படும் செயல் ஆகும்.

சுவாசம் என்பது ரெஸ்பிரோ (respireo) என்றலத்தின் மொழியிலிருந்து வந்ததாகும். நுரையீரலின் பரப்பளவு தோராயமாக ஒரு டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானத்தின் அமைப்பை போன்றதாகும்.

சாதாரணமாக சுவாசம் மற்றும் நாடித்துடிப்பின் விகிதம் 1 - 4 ஆகும்.

சாதாரண சுவாசத்தின் அளவு

வ.எண்	பருவம்	எண்ணிக்கை/ நிமிடம்
1	பிறந்த குழந்தை	35 –40
2	ஒரு வயது குழந்தை	30 –50
3	நடைபயிலும் குழந்தை	25 –32
4	குழந்தை	20 –30
5	வயதுவந்தோர்	16 –20
6	பெரியவர்	12 –20

5.7.1 சுவாசத்தின் அளவை பாதிக்கும் காரணிகள் (வயதைதவிர)

1. பாலினம்:–ஆண்களைவிட பெண்களுக்கு எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.
2. உடற்பயிற்சி:- எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது
3. உணர்ச்சிகள்:- பயம் போன்றவை சுவாசத்தை பாதிக்கின்றன.
4. வெப்பம்:- வெந்நீர் மற்றும் வெப்ப பகுதி போன்றவை சுவாசத்தின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து சுவாசத்தின் ஆழத்தை மாற்றுகிறது.
5. குளிர்:- சுவாசத்தை முழுமையானதாகவும் ஆழமானதாகவும் மாற்றுகிறது.
6. மருந்துகள்:–மயக்க மருந்துகள் சுவாசத்தின் அளவைக் குறைக்கின்றன.
7. சுவாசக்கோளாறுகள்:- நிமோனியா போன்ற சுவாசப்பிரச்சனையில் சுவாசத்தின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துகின்றன.
8. நோய்கள்:–காய்ச்சல், வலி, இரத்தசோகை, இரத்த ஒழுக்கு மற்றும் அதிர்ச்சி போன்றவை சுவாசத்தின் அளவை அதிகப்படுத்துகின்றன.
9. சுயநினைவற்ற நிலை மற்றும் மூளைக்காயங்கள் சுவாசத்தின் அளவைக் குறைக்கின்றன.

செய்முறை:– (சுவாசம் அளவிடல்)

1. நோயாளி ஓய்வில் இருக்க வேண்டும். மேலும் நாம் சுவாசம் அளவிடுதலை அவர் அறியாத வண்ணம் எடுப்பதற்காக

Nursing General_Tamil Ch-5.indd 76 14-06-2018 19:12:49