- நுண்ணோக்கியின் பிரிதிறன், $R_{\mathrm{M}} = \dfrac{1}{d_{\min}} = \dfrac{2(NA)}{1.22\lambda}$
- தொலைநோக்கியின் பிரிதிறன், $R_T = \dfrac{1}{r_0} = \dfrac{a}{1.22\lambda f}$
- அண்மைப் புள்ளி குவியப்படுத்துதலில், ஒரு கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கத்திற்கான வாய்பாடு, $m = m_o m_e = \left(\dfrac{L}{f_o}\right)\left(1 + \dfrac{D}{f_e}\right)$
- இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதலில், ஒரு கூட்டு நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கத்திற்கான வாய்பாடு, $m = m_o m_e = \left(\dfrac{L}{f_o}\right)\left(\dfrac{D}{f_e}\right)$
- தொலைநோக்கியில் உருப்பெருக்கம், $m = \dfrac{f_o}{f_e}$; குழாயின் நீளம், $L = f_o + f_e$
- கிட்டப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யும் லென்சு ஒரு குவிலென்சு ஆகும்; அதன் குவியத்தூரம் $f = -x$. இங்கு x என்பது தெளிவாகத் தெரியும் குறைந்தபட்சத் தொலைவு.
- தூரப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யும் லென்சு ஒரு குழிலென்சு ஆகும்; அதன் குவியத்தூரம் $f = \dfrac{y \times 25\ \mathrm{cm}}{y - 25\ \mathrm{cm}}$. இங்கு $25\ \mathrm{cm}$ என்பது தெளிவாகத் தெரியும் குறைந்தபட்சத் தொலைவு.
- வயது மூப்பு காரணமாக ஏற்படும் தூரப்பார்வைக்கு வெள்ளெழுத்து என்று பெயர்.
- விழி லென்சில் வெவ்வேறு வளைவு ஆரங்களைப் பெற்ற தளங்கள் காணப்படுவதால் ஏற்படும் குறைபாட்டிற்கு ஒருதளப்பார்வை என்று பெயர்.

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 100 06-08-2020 12:30:57