7.3.2.1 அகக் காரணிகளாலான உறங்குநிலை

1. உடலியங்கியல் உறங்குநிலை

விதையினுள் குறிப்பிட்ட வேதி மாற்றம் ஏற்படும் வரை முளைத்தல் தடுக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக அப்சிசிக் அமிலம் வளர்ச்சி செயற்குறைப்பியாகும். குளிர் அல்லது ஈரப்பதமான சூழலில் இந்த நிலை நீங்கும். புல் விதைகளில் முளைத்தலுக்கு முன்னர் உலர்நிலை தேவைப்படுகிறது. ஒளி அல்லது இருளில் முளைக்கும் விதை மாறுபட்ட சூழலில் முளைக்காது.

2. உருவவியல் உறங்குநிலை

வளர்ச்சி குறைந்த அல்லது உயிரணு வேறுபாடு சரியாக நிகழாத பொழுது விதை முளைக்காது.

3. உருவ-உடலியங்கியல் உறங்குநிலை

உடலியங்கியல் மற்றும் உருவவியல் ஆகிய இரண்டு நிலைகளையும் கொண்ட விதைகளில் முளைத்தல் தடைபடும்.

7.3.2.2 புறக்காரணிகளாலான உறங்கு நிலை

1. இயற்பியல் உறங்குநிலை

இவ்வகையில் நீர் மற்றும் காற்று ஆகியவற்றை உட்புக விடாத தன்மை கொண்ட உறை விதையைச் சுற்றி தோன்றும். இது ஒரு முறை அகற்றப்பட்டால் பின்னர் உறங்குநிலை திரும்ப வராது. எனவே முளைத்தலுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

2. பொறி முறை உறங்குநிலை

கடினமான விதை உறை கொண்ட பயிர்களில் முளை வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலையில் முளைத்தல் தடைபடும். இந்நிலையில் கடின விதை உறையில் காயம் மற்றும் சிராய்ப்புகள் ஏற்படுத்தலாம்.

3. வேதியியல் உறங்குநிலை

விதையை மூடி இருக்கும் உறையில் உள்ள வேதிப்பொருளின் தாக்கத்தால் விதை முளைக்காது. நீரில் ஊறப்போடுதல், கழுவுதல் ஆகிய முறைகளால் உறங்கு நிலையை நீக்கலாம்.

7.3.2.3 இணைந்த உறங்குநிலை

அக மற்றும் புறக்காரணிகள் இணைந்து விதை முளைப்பை தடுக்கும்.

7.3.2.4 இரண்டாம் நிலை உறங்குநிலை

உறங்கு நிலை இல்லாத விதைகளில் முளைத்தலுக்கு பாதகமான சூழல் ஏற்படும் போது தோன்றும்.

7.3.3 உறங்குநிலை அகற்றுதல் (Breaking Seed Dormancy)

1. **வித்து உறை அகற்றம்:** தடித்த வித்து உறையை அகற்றினால் விதை முளைக்கும். **(உ.ம்)** பயறு விதைகளில் காயம் ஏற்படுத்துதல், இரப்பர் விதையின் உறையை அகற்றுதல்.



2. **வெப்பப்படுத்துதல்:** குறைந்த அல்லது அதிக வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தும்போது சில விதைகளின் உறக்கநிலை நீக்கப்படும். **(உ.ம்)** (i) கடுகு விதையை 0–5°C வெப்பநிலையில் 3-6 நாட்கள் வைத்திருத்தல்.

(ii) நெல் விதையை 40-50°C வெப்பநிலையில் 4-5 நாள் வைத்திருத்தல்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_07.indd 110 15-02-2019 12:04:51