மற்றும் பயிர்களுக்குரிய நீர், நில ஆதாரங்களுக்கு போட்டியிட்டு பயிர் உற்பத்தியையும் மனித மேம்பாட்டையும் பாதிப்பவையே **களைகள்** ஆகும்.

10.2 களைகளின் இயல்புகள் (Characteristics of Weeds)

- களைகள் எல்லாக் காலங்களிலும் தோன்றி செழிப்பாக வளரும்.
- ஒவ்வொருவருடமும்களைகள் ஏராளமான விதைகளை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- களைகளின் விதைகளைச் சுற்றி உள்ள உறை, உரோமம் மற்றும் முட்களின் உதவியால் விலங்குகளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்கின்றன.
- சில களைகளின் விதைகளில் இறகுகள் போன்ற அமைப்பு இருப்பதால் காற்றில் வெகுதூரம் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன.
- பெரும்பாலான களைகள் விதையில்லா இனப்பெருக்கம் மூலம் வேகமாகப் பெருகுகின்றன.
- களைகளின் விதைகள், பயிர்களின் விதைகளைப் போல் ஒத்த அமைப்பைக் கொண்டுள்ளதால் விதைகளிலிருந்து பிரிப்பது கடினம்.
- களைகள் எல்லா மண்ணிலும் செழிப்பாக வளர்ந்து மண்ணிலுள்ள சத்துக்களை கிரகித்துக் கொள்ளும் தன்மை உடையவை.

10.3 பயிர், களைகளுக்கு இடையேயான போட்டியின் நெருக்கடியான காலகட்டம் (Critical Period of Crop – Weed Competition)

- பயிருடன் களைகள் போட்டியிடும் நெருக்கடியான காலம் என்பது குறுகிய கால அளவைக் கொண்டது. எனவே பயிர் வளர்ச்சிப் பருவத்தில் களைகள் அகற்றப்படுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும்.
- இந்த கால இடைவெளியில் களை எடுப்பதனால் கிடைக்கும் பயிர் மகசூல், பயிரின் விதைப்பு முதல் அறுவடை வரையிலான பருவத்தில் களை இல்லா நிலைகளில் கிடைக்கும் மகசூல் அளவுக்குச் சமமானதாகும்.
- பயிர் பருவத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு காலம் களைகள் பயிர்களுடன் போட்டியிடும் நெருக்கடியான காலம் ஆகும்.

பயிர்கள்	நெருக்கடியான காலம் – நாட்கள் (விதைப்பிற்கு பின்)
நெல் (நடவு செய்த சேற்று நெல்)	15 – 45
மேட்டுப்பாங்கான நிலத்தில் நெல்	பயிர் காலம் முழுவதும்
கோதுமை	30 – 45
மக்காச்சோளம்	15 – 45
சோளம்	15 – 45
கேழ்வரகு	25 – 45
சோயாமொச்சை	15 – 45
உளுந்து	30 – 45
பருத்தி	15 – 60
கரும்பு	30 – 120
நிலக்கடலை	30 – 50
சூரியகாந்தி	30 – 45
ஆமணக்கு	30 – 60
எள்	15 – 45

மேற்கூறிய காலகட்டங்களில் களைகள் இல்லாமல் பாதுகாத்தால் நல்ல மகசூலைப் பெறலாம்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_10.indd 158 15-02-2019 12:11:20