முக்கியமான பயிர்களும், களைக்கொல்லிகளும்

பயிர்	இரசாயனப்பெயர்	அளவு / எக்டர் மிலி / கி	காலம்
நெல்	பியூட்டாகுளோர்	1000	மு.முன்
	பிரெட்டில்லாக்குளோர்	500	மு.முன்
	2, 4–D	500	மு.பின்
கரும்பு	அட்ரசின்	1000	மு.முன்
	மெட்ரிபூசின்	100	மு.பின்
	ஹேலோ சல்ஃபியூரான் மீதைல்	36	மு.பின்
பருத்தி	ஃபுளூகுளோரலின்	1000	மு.முன்
	பென்டிமெத்தலின்	1250	மு.முன்
	குயிசாஃபாப் ஈதைல்	250	மு.பின்
	புரொப்பாகுயிசாஃபாப்	250	மு.பின்
	ஃபெனக்சாபுரொப்–பி–ஈதைல்	500	மு.பின்
பயறுவகைகள்	ஃபுளூகுளோரலின்	1000	மு.முன்
	பென்டிமெத்தலின்	1250	மு.முன்
	குயிசிலோஃபாப் ஈதைல்	250	மு.பின்
	புரொப்பாகுயிசாஃபாப்	250	மு.பின்
நிலக்கடலை	ஃபுளூகுளோரலின்	1000	மு.முன்
	பென்டிமெத்தலின்	1250	மு.முன்
	குயிசிலோஃபாப் ஈதைல்	250	மு.பின்
	புரொப்பாகுயிசாஃபாப்	250	மு.பின்
மஞ்சள்	ஆக்ஸிபுளோர்ஃபென்	400	மு.முன்
வெங்காயம்	ஆக்ஸிபுளோர்ஃபென்	400	மு.முன்
	பென்டிமெத்தலின்	1250	மு.முன்
காய்கறிகள்	பென்டிமெத்தலின்	1250	மு.முன்
மலைத் தோட்டப் பயிர்கள் மற்றும் பயிரிடப்படாத நிலம்	கிளைஃபோசேட்	2000	மு.பின்
	2, 4–D சோடியம் உப்பு	500	இருவித்திலைக் களைகள் மு.பின்

மு.முன் – முளைப்பதற்கு முன்
மு.பின் – முளைத்த பின்

X1_AGRI_Tamil_Chapter_10.indd 169 15-02-2019 12:11:23