8. கனகாம்பரம் வேர் அழுகல் நூற்புழு (Crossandra Root Lesion Nematode)

முதிர்ந்த இலைகள் கத்தரிப்பூ நிறமடையும்.





11.9.2 நூற்புழுக்களின் வகைப்பாடு

இவை உணவு உட்கொள்ள தேர்ந்தெடுக்கும் இடத்தைப் பொருத்து நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்படும்.

1. முழுமையான அக வேர் நூற்புழு
2. வேரில் முழுமையாக உட்புகாத நூற்புழு
3. புறவேர் நூற்புழு
4. இலை, மொக்கு, பூக்களை உண்ணும் நூற்புழு

11.9.3 நூற்புழு மேலாண்மை

1. வரப்பு பயிராக செண்டுமல்லியைப் பயிரிட்டு கனகாம்பர வேரழுகல் நூற்புழுவைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
2. ஊடுபயிராக சாமந்தி, கொத்தமல்லி, தட்டைப்பயறு பயிரிட்டு வாழைக் கிழங்கு குடையும் நூற்புழுவைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
3. உயிர் பூசணக் கொல்லியான டிரைக்கோடெர்மா விரிடி அல்லது சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ் 1.0 கிகி விதைக்கு 10.0 கி அல்லது ஓர் எக்டருக்கு 2.5 கிகி பயன்படுத்தலாம்.
4. இரசாயன முறையில் ஆல்டிகார்ப் 10 சத குறுணை எக்டருக்கு 10.0 கிகி (அ) கார்போஃபியூரான் 2 சத குறுணை எக்டருக்கு 30.0 கிகி மருந்தை , 10.0 கிகி மணலுடன் கலந்து தூவி நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.

தட்டான் தாழப் பறந்தால் மழை.
குருவி ஏறக் கொம்பிருந்தால் குறுணி வரகு குறைவாகும்.
– பழமொழி

இவ்வுலகம் அனைத்து உயிரினங்களும் வாழக்கூடிய இடம். இதில் நாம் சாகுபடி செய்யும் பயிர்களும், அவற்றைத் தாக்கும் உயிரிகளும் அடங்கும். பூச்சிகளை முற்றிலுமாக அழிக்க முடியாது. தீமை தரும் பூச்சிகளை அழிக்க முற்பட்டால், நன்மை தரும் பூச்சிகளும் அழியக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். எனவே பயிர்களைக் காக்க நாம் எடுக்கும் நடவடிக்கை சுற்றுப்புறச்சூழலை பாதிக்காமல், தீங்கு தரும் பூச்சிகளை பொருளாதார சேதநிலைக்குக் கீழ் கொண்டு வருவதாக இருக்க வேண்டும். எனவே, விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி கட்டுப்பாட்டு முறைகளைப் பின்பற்றி, சேதத்தைக் குறைத்து, பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிப்பது சிறந்தது.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_11.indd 186 15-02-2019 12:33:55