தீவனத்துடன் சேர்த்து இரத்தக் கழிச்சல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த கொடுக்க வேண்டும். தீவனம் நன்றாக உலர்ந்த நிலையில் இல்லையென்றால் அஃப்ளாடாக்சின் (Aflatoxin) நச்சு உருவாகி கோழிகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

15.8.4 பன்றிகளுக்கான தீவனம்

பன்றி வளர்ப்பில் மேய்ச்சலுக்கு அனுமதித்தல் மற்றும் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி வளர்த்தல் என இரண்டு விதமான உணவூட்டம் பின்பற்றப்படுகிறது. குதிரை மசால், சிவப்பு குளோவர், சூடான் புல், வேலி மசால், முயல் மசால் போன்ற தீவனப் பயிர்களை வளர்த்து பன்றிகளை மேயவிடுதல் மேய்ச்சல் முறையாகும். சமையல் கூடங்கள், விடுதி மற்றும் அங்காடிகளில் கிடைக்கும் காய்கறிக் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி கொட்டகைகளில் வளர்ப்பது இரண்டாவது முறையாகும். பன்றிகளின் வளர்ச்சிக்கு குறைந்த அளவு நார்ச்சத்து, கால்சியம், இரும்பு போன்ற சத்துக்களுடன் சுத்தமான குடிநீர் அவசியம்.

15.9 இனப்பெருக்கம் (Breeding)

15.9.1 இனப்பெருக்கத் திறனை மேம்படுத்தும் முறைகள்

1. சினை அடைந்த காலம், கன்று ஈன்ற நாள் போன்றவற்றை பதிவேட்டில் பராமரித்தல்.
2. சரியான சினை பருவ காலத்தில் கலப்பு செய்தல்.
3. ஒவ்வொரு இனக்கலப்பிற்குப் பிறகும், கன்று ஈனும் முன்பும் ஒரு முறை முழுமையாக உடல் பரிசோதனை செய்தல்.
4. ஒவ்வொரு முறை கன்று ஈன்ற பின்பும் கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்தல்.
5. சரியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பெற்றுள்ளதா என்பதைக் கண்காணித்து தடுப்பூசிகளை முன்பே போடுதல்.

15.9.2 கால்நடைகளில் இனப்பெருக்கம்

இனப்பெருக்கம் இயற்கை மற்றும் செயற்கை முறைகளில் செய்யப்படுகிறது.

இயற்கை முறை இனவிருத்தி

இம்முறையில் உள் இனச்சேர்க்கை (Inbreeding), வெளி இனச்சேர்க்கை (Cross Breeding) மற்றும் தரம் உயர்த்துதல் (Upgrading) என மூன்று முறைகளில் செய்யப்படுகிறது.

i. உள் இனச்சேர்க்கை என்பது ஒரே மந்தையில் உள்ள கால்நடைகளிலேயே இனப்பெருக்கம் செய்வதாகும்.
ii. வெளி இனச்சேர்க்கை என்பது ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு இல்லாத இரண்டு வெவ்வேறு இனங்களை இனச்சேர்க்கை செய்து புதிய சந்ததியாக கலப்பினத்தை உருவாக்குவது ஆகும்.
iii. தரம் உயர்த்துதல் என்பது நம் நாட்டு கால்நடைகளின் நோய் எதிர்ப்புத்திறன் மற்றும் சராசரி பராமரிப்புக்கு ஒத்து வரும் தன்மை ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட வம்சாவழிகளை உருவாக்குவது ஆகும்.

செயற்கை முறை இனவிருத்தி

இம்முறையில் தரமான, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காளை விந்தணுக்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, பதப்படுத்தி உறைநிலையில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் விந்தணுக்கள் –196°C அளவு குளிரூட்டப்பட்ட திரவ நைட்ரஜனில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. தேவைப்படும் போது இதை வெளியே எடுத்து 37°C தண்ணீரில் 30 வினாடிகள் வைத்திருந்து திரவ நிலைக்கு கொண்டு வந்து செயற்கை முறை கருவூட்டல் செய்யப்படுகிறது.

15.10 கால்நடைகளில் களையெடுத்தல் (Culling)

பொருளாதார ரீதியாக உபயோகமில்லாத, உற்பத்தித்திறனற்ற, கூடுதலாக உள்ள

X1_AGRI_Tamil_Chapter_15.indd 246 15-02-2019 12:39:11