5.1.3 துரித விதை பரிசோதனை (Quick Viability Test / Tetrazolium Test)

இது ஒரு உயிரி வேதியியல் முறையாகும். விதையின் பருமனைப் பொறுத்து நீளவாக்கில் (மக்காச்சோளம்) அல்லது குறுக்கு வாட்டில் (ராகி) வெட்டி அல்லது துளையிட்டு (புல் வகைகள்) அல்லது விதையுறை நீக்கி (பயறு வகைகள்) இச்சோதனையை மேற்கொள்ளலாம். ஒரு சத 2, 3, 5 – டெட்ராசோலியம் குளோரைடு கரைசலில் 1–8 மணி நேரம் விதைகளை ஊற வைக்கும் பொழுது விதையின் உயிருள்ள செல்களில் உள்ள நொதிகள் டிரைபினைல் பார்மஸானாக மாற்றமடையும். இது விதையின் உயிருள்ள பகுதிகளில் சிவப்பு நிறத்தை நிலைநிறுத்தும். சோதனையின் முடிவைப் பொறுத்து விதைக்கத் தேவையான விதையளவைக் கணக்கிடலாம்.

5.2 விதை நேர்த்தி (Seed Treatment)

விதையின் தரத்தை மேம்படுத்த சில சாதகமான பொருட்களை விதையுடன் சேர்க்கும் செயல் விதை நேர்த்தி எனப்படும்.

தெரிந்து கொள்வோமா?

கார அமில நிலை 6.5 – 7.5 உள்ள நீரையே கரைசல் தயாரிக்க பயன்படுத்த வேண்டும். இதற்கு 9.078 கி பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட்டை 1000 மிலி நீரிலும், 9.472 கி சோடியம் டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட்டை 1000 மிலி நீரிலும் தனித்தனியே கலந்து இரண்டையும் ஒன்றாகக் கலக்கலாம். 2,3,5–டிரைபினைல் டெட்ராசோலியம் குளோரைடு ஒரு சத கரைசலை தயாரித்தவுடன் பயன்படுத்துவது அவசியம்.

5.2.1 விதை நேர்த்தியின் அவசியம் (Importance of Seed Treatment)

- அதிக மகசூல் பெற
- பயிரின் தரத்தை உயர்த்த
- நோய்களுக்கு எதிராக வருமுன் காக்க
- பூச்சிகளிடமிருந்து பயிரைக் காக்க
- விதைகளை எளிதில் கையாள
- பயிர் பாதுகாப்பு செலவு குறைய
- களர் உவர் தன்மையைத் தாங்கி வளர
- இயந்திர பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு விதைகளைத் தயார்படுத்த
- வறட்சியைத் தாங்கி வளர

விதை நேர்த்தி செய்வது அவசியமாகும்.

5.2.2 விதை நேர்த்தி வகைகள் (Types of Seed Treatment)

இரசாயனம் மற்றும் சிறப்பு விதை நேர்த்தி என இரண்டு வகைகள் உள்ளன. இரசாயன விதை நேர்த்தி பயிர் பாதுகாப்பு விதை நேர்த்தி, தூண்டுதல் விதை நேர்த்தி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.

I இரசாயன விதை நேர்த்தி (Chemical Seed Treatment)

1. பயிர் பாதுகாப்பு விதை நேர்த்தி (Plant Protection Seed Treatment)

1.1 பூச்சிக் கொல்லி விதை நேர்த்தி (Insecticidal Seed Treatment)

சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்குதலைத் தவிர்க்க இவ்வித நேர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

(உ.ம்) பருத்தி மற்றும் காய்கறிப் பயிர்களுக்கு இமிடாகுளோபிரிட் (1.0 கிகி விதைக்கு 7.0 கி).

1.2 பூசணக் கொல்லி விதை நேர்த்தி (Fungicidal Seed Treatment)

இரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தி விதை மற்றும் மண் மூலம் பரவும் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம். (உ.ம்) அனைத்து பயிர்களுக்கும் - 1.0 கிகி விதைக்கு 2.0 கி திராம் அல்லது கார்பன்டசிம்.

Agri_Prac_Chapter_05.indd 300 15-02-2019 12:53:08