3.3 சவ்வூடு பரவல் மூலம் ஊட்டமேற்றுதல் (Osmo – Priming)

6000 – 8000 பிபிஎம் பாலி எத்திலீன் கிளைக்கால் அல்லது ஒரு சத பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பயன்படுத்தலாம்.

3.4 மண் மூலம் ஊட்டமேற்றுதல் (Soil Matrix Priming – SMP)

தாவரம் வளரக்கூடிய ஊடகத்தில் (அக்ரோலிக்) அதன் நீர் பிடிப்புத்திறனைப் பொருத்து குறிப்பிட்ட அளவு நீர் ஊற்றி விதை நேர்த்தி செய்யும் முறையாகும். அதிக வெப்பத்தின் காரணமாக சில பயிர்களின் விதைகள் உறக்கநிலைக்குச் செல்லாமல் இருக்க, அதில் ஈரத்தன்மை கொண்ட மணலைப் பயன்படுத்தி ஊட்டமேற்றலாம். இதனால் விதைகள் விரைவாக முளைப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

(உ.ம்) கத்தரி, தக்காளி, வெண்டை, மிளகாய் – 80 சத ஈரமுள்ள மணலில் மூன்று நாட்கள் வரை வைத்திருத்தல்.

மாணவர் செயல்பாடு

1. தரமான விதைகளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறைகளை செய்து பார்த்தல்
2. பல்வேறு விதமான விதை நேர்த்தி முறைகளைக் கையாளுதல்

பார்வை

1. https://seednet.gov.in/PDFFILES/Chapter2014%.pdf
2. https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context
3. agritech.tnau.ac.in/seed.../seed20%treatments_Live20%seed
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030442388890146X
5. https://www.actahort.org/books/8_607/607.htm

Agri_Prac_Chapter_05.indd 302 15-02-2019 12:53:08