V. உயிர் உரங்கள் (BIO–FERTILIZERS)

வ.எண்	உரத்தின் பெயர்	ஊட்டச்சத்து
1.	*அசோஸ்பைரில்லம் (Azospirillum)*	தழைச்சத்து (N)
2.	*அசோட்டோபாக்டர் (Azotobacter)*	தழைச்சத்து (N)
3.	*அசிட்டோபாக்டர் (Acetobacter)*	தழைச்சத்து (N)
4.	*ரைசோபியம் (Rhizobium)*	தழைச்சத்து (N)
5.	*அனபீனா (Anabaena)*	தழைச்சத்து (N)
6.	*நாஸ்டாக் (Nostoc)*	தழைச்சத்து (N)
7.	*பாஸ்போபாக்டீரியம் (Phosphobacterium)*	மணிச்சத்து (P)
8.	*ஃபிரசூரியா ஆரன்ஷியா (Fraturia aurentia)*	சாம்பல்சத்து (K)

VI. உரப் பயிர்கள் (Manure Crops)

1. பசுந்தாள் உரங்கள் (Green Manure Crops)

உரப்பயிர்	தழைச்சத்து அளவு %
சணப்பை	2.8–3.2
தக்கைப்பூண்டு	2.6–3.2
மணிலாஅகத்தி	3.2–3.4
நரிப்பயறு	2.2–3.0

2. பசுந்தழை உரங்கள் (Green Leaf Manure Crops)

உரப்பயிர்	தழைச்சத்து அளவு (%)
வேம்பு	1.0–1.2
எருக்கு	1.3–1.5
கிளைரிசிடியா	2.2–2.7
சூபாபுல்	2.5–3.7
புங்கம்	1.3–1.5

8.2 உரத் தேவையைக் கணக்கிடல் (Calculation of Fertilizer Requirement)

பொதுவாக தழை, மணி, சாம்பல்சத்துக்கள் அனங்கக உரங்களான யூரியா, சூப்பர் பாஸ்பேட், மற்றும் மியூரேட் ஆப் பொட்டாஷ் உரங்களின் மூலம் பயிருக்கு இடப்படுகின்றன.

(உ.ம்) நெல் பயிருக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் ஊட்டச்சத்தின் அளவு ஓர் எக்டருக்கு 150:50:50 கிகி தழை, மணி, சாம்பல்சத்தாகும் (ஓர் எக்டர் = 2.5 ஏக்கர்)

i. யூரியாவின் அளவைக் கணக்கிடுதல்

யூரியாவில் உள்ள தழைச்சத்து அளவு - 46% (அதாவது 46 கிகி தழைச்சத்து வேண்டுமெனில் 100 கிகி யூரியா இட வேண்டும்)

∴ 150 கிகி தழைச்சத்து வேண்டுமெனில்:

$\frac{100}{46} \times 150 = 326$ கிகி யூரியா இட வேண்டும்.

அதாவது $= \frac{100}{\text{உபயோகிக்கும் உரத்தில் உள்ள ஊட்டச்சத்தின் அளவு}} \times$ பரிந்துரைக்கப்படும் ஊட்டச்சத்தின் அளவு

ii. சூப்பர் பாஸ்பேட்டின் அளவைக் கணக்கிடுதல்

சூப்பர் பாஸ்பேட்டில் உள்ள மணிச்சத்து அளவு - 16% (அதாவது 16 கிகி மணிச்சத்து வேண்டுமெனில் 100 கிகி சூப்பர் பாஸ்பேட் இட வேண்டும்)

Agri_Prac_Chapter_08.indd 313 15-02-2019 12:56:27