வேளாண் தட்பவெப்ப மண்டலம்	அடங்கியுள்ள பகுதிகள்	ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் உள்ள இடங்கள்
வடகிழக்கு மண்டலம்	திருவள்ளூர், வேலூர், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, சென்னை, திருச்சி (அரியலூர்), விழுப்புரம் (காட்டுமன்னார்கோவில் தவிர)	திரூர்குப்பம், விரிஞ்சிபுரம், திண்டிவனம், விருத்தாசலம், கடலூர், பாலூர், சென்னை, வேப்பந்தட்டை
வடமேற்கு மண்டலம்	சேலம், நாமக்கல் (திருச்செங்கோடு தவிர), தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி	ஏத்தாப்பூர், பையூர்
மேற்கு மண்டலம்	ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர், தேனி, மதுரை (வடக்கு), சேலம், திருச்சி (கரூர்), நாமக்கல் (திருச்செங்கோடு)	பவானிசாகர், ஆழியாறு, வாகரை, தடியன்குடிசை, வைகை அணை.
காவிரி டெல்டா மண்டலம்	தஞ்சாவூர், திருச்சி (அரியலூர் தவிர), புதுக்கோட்டை (அறந்தாங்கி), கடலூர் (சிதம்பரம்), விழுப்புரம் (காட்டுமன்னார்கோவில்)	ஆடுதுறை, பட்டுக்கோட்டை, காட்டுத்தோட்டம், வம்பன், சிறுகமணி, வேப்பங்குளம்.
தெற்கு மண்டலம் (பரப்பளவில் பெரிய மண்டலம்)	சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, மதுரை	அருப்புக்கோட்டை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், அம்பாசமுத்திரம், கோவிலாங்குளம், பரமக்குடி, கேணிக்கரை, சங்கரன்கோவில், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி.
அதிக மழை பெறும் மண்டலம்	கன்னியாகுமரி	திருப்பதிசாரம், தோவாளை, பேச்சிப்பாறை
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மண்டலம்	நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏலகிரி, ஜவ்வாது மலை, பச்சை மலை, கொல்லி மலை, சேர்வராயன் மலை, ஏற்காடு, ஆனைமலை, பழனி, பொதிகை மலை	நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு

2.8 பயிர் உற்பத்தியைப் பாதிக்கும் காரணிகள் (Factors Affecting Crop Production)

மரபியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் பயிர் வளர்ச்சியில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இக்காரணிகளைப் பொருத்தே விதை முளைப்பு, பயிர் வளர்ச்சி, பயிர் உற்பத்தி, பூச்சி, நோய் தாங்கும் திறன் ஆகியவை அமைகின்றன.

2.8.1 மரபியல் காரணிகள் (Genetic Factors)

1. சுற்றுச்சூழல் காரணிகளைக் காட்டிலும் அகப்பண்புகளே பயிர் உற்பத்தியில் நேரடியாகப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
2. ஒரு பயிரின் மகசூல் மரபணு காரணிகளைப் பொருத்தே அமைகிறது.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_02.indd 29 15-02-2019 11:43:30