ஆகியவற்றைச் சேர்த்து தினமும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் நன்கு கலக்க வேண்டும்.

முப்பது நாட்களில் ஏற்படும் நொதித்தல் மற்றும் வேதிமாற்றங்களினால் நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் பயிர்களுக்குத் தேவையான வளர்ச்சி ஊக்கிகள் அடங்கிய பஞ்சகவ்யா தயாராகிவிடும்.

இக்கரிம நீரினை 3.0 சதம் (3.0மிலி/100 மிலி தண்ணீர்) என்ற அளவில் நீரில் கரைத்து, காய்கறிப் பயிர்களுக்கு நடவு செய்த 10, 20, 30, 40 ஆம் நாட்களில் தெளிக்க வேண்டும். மற்ற பயிர்களுக்கு, வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ தெளிக்க வேண்டும்.

பயன்கள்

- பஞ்சகவ்யாவில் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் செறிவாக உள்ளதால் பயிர்கள் நல்ல பசுமை நிறத்துடன் விரைவாக வளர்கின்றன.
- பயிர்கள் வறட்சியைத்தாங்கி வளர்கின்றன.
- நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதில்லை.
- பூக்கள், பிஞ்சுகள் உதிர்வது தடுக்கப்படுவதால், விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது.
- வணிக மலர்களில் பஞ்சகவ்யா தெளிக்கும்போது, பூக்கள் நீண்ட நாட்கள் வாடாமல், நல்ல மணம் மற்றும் நிறத்துடன் செழுமையாக இருக்கும்.
- பயிர்களுக்கு பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புசக்தி ஏற்படுகிறது. எனவே, பூச்சி மற்றும் பூஞ்சாணக்கொல்லி மருந்துகளைத் தெளிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை.

13.7 தசகவ்யா (Dasagavya)

தசகவ்யா என்பது பஞ்சகவ்யாவில் மேலும் சில தாவரங்களின் சாறுகளைச் சேர்த்து மேம்படுத்தப்பட்டதாகும். இதனால் பஞ்சகவ்யா மேலும் மெருகேற்றப்பட்டு நல்ல பயனளிக்கிறது. இதைப் பயிரின் மீது தெளிக்கும்போது பெரும்பாலான பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. நோய் எதிர்ப்புச்சக்தியையும் அதிகரிக்கின்றது.

தேவையான பொருட்கள்

1. பசுஞ்சாணம்	- 7.0 கிகி
2. பசுநெய்	- 1.0 லி
3. கோமியம்	- 10.0 லி
4. தண்ணீர்	- 10.0 லி
5. பசும்பால்	- 3.0 லி
6. பசுந்தயிர்	- 2.0 லி
7. இளநீர்	- 3.0 லி
8. வெல்லம் (அ) கரும்புச்சாறு	- 3.0 கிகி
9. வாழைப்பழம்	- 12
10. வேப்பிலைச் சாறு	- 1.0 லி
11. எருக்க இலைச் சாறு	- 1.0 லி
12. ஊமத்தை இலைச் சாறு	- 1.0 லி
13. நொச்சி இலைச் சாறு	- 1.0 லி
14. புங்க இலைச் சாறு	- 1.0 லி

செய்முறை

மேலே கூறியுள்ள மூலப்பொருட்களில் பசுஞ்சாணம் மற்றும் நெய்யை ஒரு சுத்தமான சட்டியில் கலந்து இரண்டு நாட்கள் வைத்திருந்து, கோமியத்தையும் தண்ணீரையும் சேர்த்து 15 நாட்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். பின்னர், பசும்பால், பசுந்தயிர், இளநீர், வெல்லம்(அ) கரும்புச்சாறு மற்றும் பூவன் வாழைப் பழங்களைச் சேர்த்து நன்கு கலக்க வேண்டும். இந்தக் கலவையை 25 நாட்கள் வைத்திருந்து நொதிக்க விட வேண்டும். நொதித்தல் மற்றும் வேதிமாற்றங்களினால் நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் பயிர்களுக்குத் தேவையான வளர்ச்சி ஊக்கிகள் அடங்கிய பஞ்சகவ்யா தயாராகிவிடும்.

இத்துடன் உன்னிப்பூ(லான்டனா காமரா), தும்பை(வியூகஸ் ஆஸ்பெரா), ஊமத்தை(டாட்டுரா மெட்டல்), மைச்செடி(ஃபைட்டோலேக்கா ஆக்டேன்ட்ரா), மக்கிப்பூ(ஆர்டிமீசியா நில்கிரிகா) போன்ற மலைப்பிரதேச தாவரச்செடிகளின் சாறு அல்லது சமவெளிப் பகுதிகளில் எளிதில்

Agri_Prac_Chapter_13.indd 338 15-02-2019 13:59:09