கிடைக்கக்கூடிய வேம்பு (அசாடிராக்டா இண்டிகா), காட்டாமணக்கு(ஜட்ரோஃபா கர்கஸ்), நொச்சி (விட்டெக்ஸ் நெகுன்டோ), ஆடாதொடை (ஆடாதொடா வாஸிகா), ஊமத்தை (டாட்டுரா ஸ்ட்ரமோனியம்), புங்கம் (பொங்கேமியா க்ளாப்ரா), கொளிஞ்சி (டெஃப்ரோசியா பர்ப்பூரியா) போன்றவற்றில் ஏதாவது ஐந்து தாவரங்களின் துண்டாக்கப்பட்ட இலைகளை 1:1 (1.0 லி கோமியம்: 1.0 கிகி இலை)என்ற விகிதத்தில் தனித் தனியாக கோமியத்தில் 10 நாட்களுக்கு ஊற வைக்க வேண்டும்.

பிறகு வடிகட்டி எடுத்த 5.0 லி சாற்றினை பஞ்சகவ்யத்தோடு 1:5 என்ற விகிதத்தில் நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். இதுவே தசகவ்யா ஆகும்.

பயன்கள்

1. தசகவ்யா தெளிப்பதால் பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புசக்தி அதிகம் கிடைக்கிறது. இதனால் பூச்சி மற்றும் நோய்களின் தாக்கம் தவிர்க்கப்படுகிறது.
2. தசகவ்யா 3.0 சதக் கரைசல் தெளிப்பதால், இலைப்பேன், அசுவினி, சிலந்திப் பூச்சிகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
3. இலைப்புள்ளி, இலைக்கருகல் மற்றும் சாம்பல் நோய் போன்றவை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

- எப்பொழுதும் தசகவ்யா கலவையைக் காற்றோட்டமான இடத்தில் நிழலில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- ஒரு நாளைக்கு பத்து முறையாவது கலக்கி விட வேண்டும்.
- தெளிப்பதற்கு முன் நன்கு வடிகட்டிக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் தெளிப்பானில் அடைப்பு ஏற்படும்.

13.8 அமிர்தக்கரைசல் (Amirthakaraisal)

இரசாயன சாகுபடி முறையிலிருந்து இயற்கை வேளாண் முறைக்கு மாற்றப்படும் ஆரம்ப காலங்களில் இது மிகவும் தேவை. அமிர்தக்கரைசல் மண்ணை வளப்படுத்தவும் உயிரில்லாத மண்ணை உயிருள்ளதாக மாற்றவும் கூடியது.

தயாரிக்கும் முறை

தேவையான பொருட்கள் (ஓர் ஏக்கருக்குத் தேவையானது)

1.	பசு நெய்	- 250 கி
2.	தேன்	- 500 கி
3.	பசுஞ்சாணம்	- 10 கிகி
4.	தண்ணீர்	- 200 லி

செய்முறை

நெய்யுடன் பசுஞ்சாணத்தை நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். இத்துடன் தேன் சேர்த்து கிளறி நீரை ஊற்றி நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். இவ்வாறு தயாரிக்கப்படும் கரைசலே அமிர்தக்கரைசல் எனப்படும்.

உபயோகிக்கும் முறை

- நாற்றுகளை நடும் போது வேர்ப் பகுதியை அமிர்தக்கரைசலில் நனைத்து நடலாம்
- கரும்பு, மஞ்சள், இஞ்சி ஆகியவற்றை நனைத்து நடலாம்
- கால்வாய் (அ) கிணற்றுப்பாசனம் செய்யும் பயிர்களுக்கு அமிர்தக்கரைசலைத் தண்ணீருடன் கலந்து நீர் பாய்ச்சலாம்
- மானாவாரி பயிர்களுக்கு விதை நேர்த்தி செய்யலாம்
- மண் நனைத்தல் மூலமாகவும் செடிகளுக்கு அளிக்கப்படுகிறது
- அமிர்தக்கரைசலை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினாலும் இளம் பயிர்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது

Agri_Prac_Chapter_13.indd 339 15-02-2019 13:59:09