16 சேமிப்பு தானியப் பூச்சிகளும் கண்காணிப்புப் பொறிகளும் (Storage Pests and Monitoring Traps)

சேமிப்பு தானியப் பூச்சிகள்

சேமிப்பு தானியப் பூச்சிகளால் இந்திய அளவில் 12-16 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் அளவு உணவு தானியங்கள் சேதமடைவதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது; இதன் மதிப்பு தோராயமாக 50000 கோடி ரூபாயாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 20 சதம் அளவுக்கு சேமிப்பு தானியங்கள் சேதமடைவதாகப் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. புழு, பூச்சிகள் தானியங்களைத் துளைத்து உண்பதுடன், கழிவுப் பொருட்களால் தானியங்களை அசுத்தப்படுத்தி மனிதன் உண்பதற்குத் தகுதியற்றவையாக ஆக்கிவிடுகின்றன. தானியத்தில் பூச்சிகளின் கழிவுப் பொருட்கள் சேர்வதால் ஈரப்பதம் அதிகரித்து பூசணங்கள் தோன்றும். இது தானியங்களை கெட்டியாக்கி, துர்நாற்றம் வீசச் செய்து, முளைக்கும் திறனை இழக்கச் செய்கிறது.

பூச்சிகள் தானியங்களை சேதப்படுத்தும் முறைகளைக் கொண்டு அவற்றை உள்ளிருந்து உண்பவை மற்றும் வெளியிலிருந்து உண்பவை என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

16.1 உள்ளிருந்து உண்பவை (Internal Feeders)

16.1.1 அரிசி வண்டு: (*சைட்டோஃபைலஸ் ஒரைசே*)

இவ்வண்டு கோதுமை, அரிசி, மக்காச்சோளம், சோளம் ஆகிய தானியங்களை சேதப்படுத்துகின்றன. வண்டு 3.0 மிமீ நீளத்தில் கறுப்பு அல்லது கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இது தானியத்தின் மேல் பாகத்தைச் சுரண்டி முட்டையிட்டு ஒரு வித திரவத்தால் மூடி விடும். முட்டையில் இருந்து வெளிவரும் கால்களற்ற புழுக்கள் அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.



அரிசி வண்டு

16.1.2 நெல் துளைக்கும் வண்டு: (*ரைசோபெர்த்தா டொமினிகா*)

இப்பூச்சியால் தாக்கப்படும் தானியங்களில் நெல், கோதுமை, சோளம், மக்காச்சோளம், மிளகு ஆகியவை முக்கியமானவை. 3.0-4.0 மிமீ நீளமுள்ள இப்பூச்சிகள் கரும்பழுப்பு நிறமுடையவை. இதன் தலைப்பகுதி முக்கோண வடிவில் வளைந்தும், மார்புப்பகுதி சாய்ந்தும் இருக்கும். இப்பூச்சி தனித்தோ, கூட்டமாகவோ தானியம், கோணிப்பை, துவாரங்கள் அல்லது சுவர் இடுக்குகளில் முட்டையிடும். கால்கள்

Agri_Prac_Chapter_16.indd 348 15-02-2019 14:57:55