17.2 தீவனப் பயிர்களை இனம் கண்டறிதல் (Identification of Forage Crops)

உலக கால்நடைகளின் எண்ணிக்கையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இந்தியாவில் உள்ளது (சுமார் 530 மில்லியன்). ஆனால் மொத்த பயிர் சாகுபடி பரப்பில் தீவனப் பயிர் சாகுபடி பரப்பளவு 4.6% மட்டுமே. தமிழ்நாட்டில் தீவனப் பயிர் சாகுபடி 3.3% பரப்பு மட்டுமே.

கால்நடைகளுக்கு பசுந்தீவனம், உலர்தீவனம், அடர்தீவனம் போன்ற சரிவிகித தீவனம் தேவை. அவற்றில் பசுந்தீவனத் தேவையை பூர்த்தி செய்வது கீழ்காணும் தீவனப் பயிர்களே ஆகும்.

17.2.1 தீவனப் பயிர்களின் வகைகள் (Types of Forage Crops)

17.2.1.1 தானிய வகை தீவனப் பயிர்கள்

இவ்வகை பயிர்களில் 40-60% மாவுச்சத்தும் 6-10% புரதச்சத்தும் உள்ளன (உ.ம்):

1. மறுதாம்பு தீவனச் சோளம் (இரகம்: COFS- 29, CO- 31):
   இது இறவையில் பல்லாண்டுத் தீவனப்பயிராகசாகுபடி செய்வதற்குஏற்றது. 70 நாட்களில் முதல் அறுவடையும் பின்னர் 50 நாட்களில் அடுத்தடுத்த அறுவடையும் மேற்கொள்ளலாம். அறுவடைக்குப் பின் 2-3 மாதங்கள் வரை வறட்சியைத் தாங்கி மீண்டும் நீர்ப்பாசனம் அல்லது மழையினால் துளிர் விட்டு வளரும்.
2. தீவன மக்காச்சோளம் (இரகம் : ஆஃபிரிக்கன் நெட்டை மற்றும் தீவன கம்பு):
   இதுவும் இறவை சாகுபடிக்கு ஏற்ற தீவனப் பயிர். 65 நாட்களில் முதல் அறுவடைக்கு வரும்.

17.2.1.2 பயறு வகை தீவனப் பயிர்

இவ்வகைப் பயிர்களில் 15-20% புரதச்சத்தும், 1.5% கால்சியம் மற்றும் இதர தாது உப்புகளும் உள்ளன.

1. வேலிமசால் மற்றும் குதிரைமசால் (CO-2):
   இறவையில் பல்லாண்டு பயிராக சாகுபடி செய்ய ஏற்றது. இதன் விதைகளை 1-2 செமீ ஆழத்தில் விதைப்பு செய்ய வேண்டும். அதிக ஆழத்தில் விதைக்கக் கூடாது. வேலிமசால் 80 நாட்களிலும், குதிரைமசால் 60 நாட்களிலும் முதல் அறுவடைக்கு வரும். அறுவடையின்போது தரையிலிருந்து சுமார் 15-20 செமீ உயரம் விட்டு அறுவடை செய்து அதிக மகசூல் பெறலாம்.
2. தீவன தட்டைப்பயறு (இரகம் COFC-8):
   இந்த வகை இரகம் உயர் விளைச்சல் இரகமாகும். குறுகிய கால ஒரு பருவத் தீவனப்பயிராகவும், தென்னந்தோப்புகளில் சாகுபடி செய்யவும் ஏற்றது. 50 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரும். 50 சதம் பூக்கும் தருணத்தில் அறுவடை செய்யலாம்.

17.2.1.3 புல் வகைத் தீவனப் பயிர்

இவ்வகைப் பயிர்களில் 30-50% மாவுச்சத்தும், 4-8% புரதச்சத்தும், உயிர்ச்சத்துக்களும் (Vitamins) உள்ளன.

1. கம்பு நேப்பியர் புல் மற்றும் கினியா புல்:
   இறவை சாகுபடிக்கு ஏற்ற தீவனப் பயிர் 75 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரும்.
2. கொழுக்கட்டை புல்: மானாவாரி சாகுபடிக்கு ஏற்ற தீவனப் பயிர். 70 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரும்.

17.2.1.4 மர வகை தீவனப் பயிர்

இவ்வகைப் பயிர்களில் 18-25% புரதச்சத்தும் 15-25% நார்ச்சத்தும் மற்றும் தாதுஉப்புகளும் உள்ளன.

1. அகத்தி மற்றும் கிளைரிசிடியா:
   வரப்புப் பயிராக பயிரிட ஏற்றது. 180-240 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரும்.
2. சூபாபுல்:
   மானாவாரியில் பல்லாண்டுத் தீவனப் பயிராக சாகுபடி செய்ய ஏற்றது. 120 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரும்.

Agri_Prac_Chapter_17.indd 357 15-02-2019 14:58:49