முன்னும் பின்னும் உருட்டி மண்ணை கடினப்படுத்துதல்.

(vi) அமில மண் (Acid Soil)

இதன் pH 6.5 க்கும் குறைவு. மழை நீரால் கால்சியம், மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், சோடியம் அயனிகளின் இழப்பீடு ஏற்பட்டு ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அதிகரித்து அமில மண் உருவாகிறது. அதிக மழை பெறும் இடங்களிலும், நிலத்தின் சரிவு மிகுந்த இடங்களிலும் இப்பிரச்சினை உருவாகிறது.

பிரச்சினை

- பயிருக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு அயனிகள் அதிகமாக இருக்கும்.
- சூப்பர் பாஸ்பேட் உரத்தை மண்ணில் இடும் போது நீரில் கரையாத அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு பாஸ்பேட்டுகளைத் தோற்றுவிப்பதால் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுவதில்லை.
- கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் குறைபாடு ஏற்படும்.
- நன்மை தரும் பாக்டீரியாக்களின் செயல்பாடு குறையும்.
- நோய்க் காரணிகளின் தீவிரம் அதிகமாகும்.

நிவர்த்தி

- சுண்ணாம்புக்கல் (கால்சியம் கார்பனேட் - $CaCO_3$)
- சுட்ட சுண்ணாம்பு (கால்சியம் ஆக்ஸைடு - CaO)
- சுண்ணாம்பு நீர் (கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைடு - $Ca(OH)_2$)
  இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை மண்ணோடு சேர்த்து உழுதல்.

(vii) உவர்மண் (Saline Soil)

இம் மண்ணில் pH அளவு 7 முதல் 8.5 வரை இருக்கும். நீரில் கரையும் உப்புக்களான சோடியம் குளோரைடு மற்றும் சோடியம் சல்பேட்டை அதிக அளவில் கொண்டிருக்கும்.



பிரச்சினை

- மண்ணின் மேற்பரப்பில் வெண்ணிற உப்பு பரவி காணப்படும்.
- பயிர்களின் நீர் உறிஞ்சும் திறன் பாதிக்கப்படும்.
- பயிருக்கு சரியான அளவில் ஊட்டச்சத்து கிடைக்காது.
- நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் செயல்திறன் குறையும்.
- அங்ககப் பொருட்களின் சிதைவுறுதல் தடைபடும்.

நிவர்த்தி

- 'ஓர்பூடு' *(Sesuvium portulacastrum)* தாவரத்தை வளர்த்து உப்பின் அளவை குறைத்தல்.
- தரமான பாசன நீரை பயன்படுத்தி உப்பை வெளியேற்றுதல்.
- பார்-சால் முறை விதைப்பு மேற்கொள்ளுதல்.
- அங்கக உரங்களை மண்ணில் இடுதல்.
- அதிக அளவு தழைச்சத்து இடுதல்.
- சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மூலம் உவர் தன்மையின் பாதிப்பினைக் குறைத்தல்.

(viii) களர் மண் (Sodic Soil)

இம்மண்ணில் pH 8.5க்கும் அதிகம். கார்பனேட், பைகார்பனேட் உப்புகள் அதிகமாவதால் இந்நிலை ஏற்படும். சோடியம் அயனிகளின் படிவு 15% அதிகம். மண்ணின் களித்துகள்களில் சோடியம் அயனிகள் அதிகமாக படிந்து காணப்படும்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_03.indd 42 15-02-2019 11:47:23