
சோதனை	இயல்பான குளுக்கோஸ் அளவு	நீரிழிவு நோயாளியின் இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு
உண்ணா நிலை இரத்த குளுக்கோஸ் சோதனை	100mg/ dl விடக் குறைவு	126mg/dl அல்லது அதைவிட அதிகம்
எந்த ஒரு நேரத்திலும் குளுக்கோஸ் சோதனை	140mg/dl விடக் குறைவு	200mg/dl அல்லது அதைவிட அதிகம்
HbA_1C சோதனை	5.7% ஐ விட குறைவு	6.5% அல்லது அதைவிட அதிகம்

3.8.3.1 குளுக்கோஸ் உடல் சகிப்புத் தன்மை சோதனை (GLUCOSE TOLERANCE TEST)

உங்களது உடல் ஆனது சர்க்கரைக்கு (glucose) எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றுகிறது என்பதனை அளந்தறிய குளுக்கோஸ் உடல் சகிப்புத்தன்மை சோதனை அல்லது வாய்வழி குளுகோஸ் உடல் சகிப்புத் தன்மை சோதனை (OGTT) பயன்படுகிறது. இச்சோதனை வகை – 2 நீரிழிவு நோயாளிகளைக் கண்டறிய பயன்படுகிறது.

இச்சோதனையைத் துவங்கும் முன்னர், இரத்த மாதிரி எடுக்கப்படுகிறது.



சோதனைக்கு உட்படுபவர் குறிப்பிட்ட அளவு குளுக்கோசைக் கொண்டுள்ள கரைசலை (வழக்கமாக 75g) அருந்த வேண்டும். இக்கரைசலை அருந்திய நேரத்தில் இருந்து 30 முதல் 60 நிமிடங்களில் இரத்த மாதிரி மீளவும் எடுக்கப்படுகிறது.

இரத்தமாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டு இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு கண்டறியப்படுகிறது. இச்சோதனை மேற்கொள்ள தோராயமாக மூன்று மணிநேரம் தேவைப்படுகிறது.

கர்ப்ப கால சர்க்கரை நோயை (gestational diabetes) கண்டறிய மாற்றியமைக்கப்பட்ட குளுக்கோஸ் உடல் சகிப்புத் தன்மை சோதனை பயன்படுகிறது.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 92 4/20/2020 1:32:26 PM