1. தைரோசினானது ஹைட்ராக்சிலேற்றம் அடைந்து டைஹைட்ராக்சி பினைல் அலனினாக மாறுகிறது. (தைரோசினானது ஹைட்ராக்சிலேற்றம் அடைந்து டைஹைட்ராக்சி பினைல் அலனினாக மாறுகிறது. (DOPA)

2. DOPA கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்கம் (Decarbozylation) பெற்று டோபாகுயினோனாக உருவாக்கம் பெறுகிறது.


3. பல்வேறு வினைகளில் மூலம் டோபாகுயினோனானது இன்டோல் குயினோனாக மாறுகிறது.

4. இண்டோல் குயினோன் பல படியாக்கல் மூலம் (polymerization) மெலனின் பெறப்படுகிறது.

4.5 தைராய்டு ஹார்மோன்களின் உருவாக்கம்

1. கனிம அயோடின் (inorganic iodine) அயோடைடாக மாற்றப்படுகிறது. (அயோடினைக் கிளர்வுபுறச் செய்தல்).

2. தைரோகுளோபுலின் என்னும் புரதத்திலுள்ள தைரோசின் வளையமானது அயோடினேற்றம் பெற்று மோனோ அயோடோ தைரோசின் (MIT) மற்றும் டைஅயோடோ தைரோசின் (DIT) உருவாகிறது.



படம் 4.15 தைராய்டு ஹார்மோன் தொகுப்பு

XII U4 Protein new_tamil.indd 111 4/22/2020 11:32:11 AM