
பாஸ்போகிளிசரைடுகள்:

பாஸ்போகிளிசரைடுகள், பாஸ்பேட்டை கொண்டிருப்பதால் கிளிசரால்பாஸ்போலிப்பிடுகள் எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை சவ்வின், லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கின் முக்கிய பகுதிக்கூறுகளாகும். பாஸ்போகிளிசரைடுகள் மூன்று கூறுகளை கொண்டுள்ளன.

(i) கிளிசராலிலுள்ள மூன்று கார்பன்களைக் (C1, C2, C3) கொண்ட சங்கிலி,

(ii) C1 மற்றும் C2 உடன் எஸ்டராக்கப்பட்டுள்ள 2 நீண்டசங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்கள்.

(iii)கிளிசராலின் C3 உடன் எஸ்டராக்கப்பட்டுள்ள பாஸ்பாரிக் அமிலம்.



படம் 1.2. பாஸ்போகிளிசரைடுகளின் அமைப்பு

பாஸ்போகிளிசரைடுகள் ஈரியல்புத் தன்மை கொண்டவை (நீர் வெறுக்கும், நீர் விரும்பும் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன). சவ்விலுள்ள பாஸ்போகிளிசரைடுகள் தோராயமாக செவ்வக வடிவில் உள்ளன (படம்). கொழுப்பு அமிலங்கள் அலிஃபாடிக் தன்மையுடையவை, அவை இரட்டை பிணைப்புகளை கொண்டிருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம் (C1 ல்) அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இரட்டை பிணைப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம் (C2 ல்).

அட்டவணை 1: கிளிசரோபாஸ்போலிப்பிடுகளில் பொதுவாக காணப்படும் தலைப்பகுதிகள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்புப்பண்புகள்

கிளிசரோபாஸ்போ லிப்பிடு பெயர்	X இன் பெயர்	X இன் வாய்ப்பாடு	நிகர மின்சுமை (PH =7 இல்)
பாஸ்பாடிடிக் அமிலம்	-	-H	-1
பாஸ்படிடைல் எத்தனாலமீன்	எத்தனாலமீன்	$-CH_2-CH_2-\overset{+}{N}H_3$	0
பாஸ்படிடைல் கோலின்	கோலின்	$-CH_2-CH_2-\overset{+}{N}(CH_3)_3$	0
பாஸ்படிடைல் செரைன்	செரைன்	$-CH_2-\underset{COO^-}{\underset{\vert}{CH}}-\overset{+}{N}H_3$	-1
பாஸ்படிடைல் கிளிசரால்	கிளிசரால்	$-CH_2-\underset{OH}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-OH$	-1

XII U1 Cell Membrane.indd 3 4/22/2020 11:25:54 AM