நோயின் பெயர்	நோய் கிருமி	பரவும்விதம்	நோயின் அறிகுறிகள் வெளிப்படும் காலம்	அறிகுறிகள்	சிகிச்சை
காசநோய்	மைக்கோ பாக்டீரியம் டூபர் குளோசிஸ்	காற்றுமூலம் பரவுதல் மற்றும் நீர்த்திவலைத் தொற்று	2–10 வாரங்கள்	இருமல், மார்பு வலி(இரத்ததுடன்)	ஸ்ட்ரேப்டோமைசின், பாராஅமினோ சாலிசிலிக் அமிலம் மற்றும் ரிபாம்பிசின்
தொண்டை அடைப்பான் Diphtheria	கொரினிபாக்டீரியம் டிப்திரே	காற்றுமூலம் பரவுதல் மற்றும் நீர்த்திவலைத் தொற்று	2–6 வாரங்கள்	சுவாசக்குழாயில் அழற்சி மற்றும் தடை	டிப்திரியா ஆன்டிடாக்சின்கள், பெனிசிலின், எரித்ரோமைசின்
காலரா	விப்ரியோ காலரே'	நேரடியாக மற்றும் மாசுற்ற உணவு மற்றும் நீர் வாய்வழி செல்லுதல்	6 மணி நேரங்கள் முதல் 2–3 நாட்கள் வரை	கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் நீர் சத்து குறைபாடு	வாய் மூலம் நீர்சத்து குறைபாடைப் போக்குதல் மற்றும் டெட்ரா சைகிளின்
தொழுநோய்	மைக்கோ பாக்டீரியம் லாப்ரே	மெதுவாக தொற்றுகிற மற்றும் தொற்றுநோய்	2–5 ஆண்டுகள்	தோல்களில் நிறமிகள் குறைபாடு, கை மற்றும் கால் விரல்களின் அமைப்பு மாறுபடுதல்	டப்சோன், ரிபாம்பிசின், குளோபாஜிம்மின்
டெட்டானஸ்	குளோஸ்ரிடியம் டேடானி	காயங்கள் மூலமாக	3–21 நாட்கள்	மோட்டார் நியூரான்களின் சிதைவு, தசை இறுக்கம் மற்றும் பக்கவாதம்	டேடானஸ் ஆன்டிடாக்ஸின்
பிளேக்	யெர்சினியா பேஸ்டிஸ்	மறைமுகமாக மற்றும் எலி போன்ற உயிரினங்கள் மூலம் பரவுதல்	2–6 நாட்கள்	பூபானிக் பிளேக் நிணநீர் முடிச்சை பாதிக்கிறது. நிமோனியா பிளேக் நுரையீரலை பாதிக்கிறது. சேப்டிஸிமிக் நிமோனியா இரத்த சோகையை உருவாக்குகிறது	டெட்ராசைகிளின், ஸ்ட்ரேப்டோமைசின், குளோரோமைசிடின்

10.2.2 வைரஸ் தொற்றுகள் (VIRAL INFECTIONS)

வைரஸ்கள் செல்தன்மையற்ற செல்களுக்கிடையேயான ஒட்டுண்ணிகளாகும். இவை ஒரே வகை நியூக்ளிக் அமிலத்தை கொண்டுள்ளன. இது ஒற்றை அல்லது இரட்டை திருகு சுருள் DNA அல்லது RNA ஆகும். வைரஸ் நோய்கள் சாதாரண சளி பிடித்தல் முதல் மிகவும் அபாயகரமான நோய்களான வெறிநாய்க்கடி (Rabies) மற்றும் AIDS போன்ற நோய்கள் வரை உள்ளடங்கும். நோய்கள் அரிதான நோயான தட்டம்மை, எண்டிமிக் நோயான ஹேப்பாடிடிஸ் (தொற்று) , எபிடமிக் நோயான டெங்கு காய்ச்சல் அல்லது பரவலான நோயான இன்ப்ளுயன்சா ஆகவோ இருக்கலாம்

XII U10 Immunology.indd 245 4/22/2020 11:22:41 AM