
மேலோட்டமான தொற்று இரண்டு வகைப்படும் (அ) மேற்பரப்பு தொற்றுகள் (தோலின் இறந்த அடுக்கில் மட்டும்) (ஆ) வெடிப்பு நோய் தொற்றுகள் (பொடிப்பட்ட அடுக்கும்).



மியூகோமைகோசிஸ் காளான்



ஹிஸ்டோபிளாஸ்மா பூஞ்சை

நோயின் பெயர்	நோய் கிருமி	பரவும்விதம்	அறிகுறிகள்	சிகிச்சை
ஈஸ்ட் தொற்றுஅல்லது கேண்டிடையாஸிஸ்	கான்டிடா ஈஸ்ட் கான்டிடா அல்பிகன்கள்	நேரடித் தொடர்பு	அரிப்பு, வீக்கம், சிவப்பாக மாறுதல் மற்றும் புண்கள் உருவாதல்	நைஸ்டாடின், குளோடிரைமசோல் மற்றும் ப்ளுகனசோல்
டெர்மடோ பைட்டோஸிஸ் டினியா குருரிஸ்	டிரைக்கோபைட்டான் ருப்ரம் மற்றும் T–மேன்டாகுரோபைட்ஸ்	நேரடித் தொடர்பு மற்றும் தொற்று உள்ளவரிடமிருந்து	வயிறு தொடை இணைவிடம், தொடையில் சிவப்பாக மாறுதல், அரிப்பு	மைகனசோல். குளோடிரைமசோல், கீட்டோகோனசோல்
சேற்றுப்புண் அல்லது டினியா பெடிஸ்	ரைக்கோபைட்டான் ருப்ரம் மற்றும் T–மேன்டாகுரோபைட்ஸ்	நேரடித் தொடர்பு	தோல்களில் சிவப்பாக மாறுதல், தோல்வெடிப்பு, கோப்புளங்கள்	எதிர் பூஞ்சை களிம்புகள் , ட்ராகோனசோல், டேர்பினபைன்
டினியா கேபிடிஸ் அல்லது செதில் வளையப்புழு	டிரைகோபைட்டான் டன்சுரன்ஸ், T–ஷோன்லைனி, T–வையோலேசியம்	நேரடித் தொடர்பு	ஆலோபிஷியா, உலர்ந்த செதில்களைச் சுற்றி திட்டுகள் தோன்றுதல்	கிரிஷியோபல்வின், டேர்பினபைன்
முயுகர்மைகோஸிஸ்	முயுகர் மற்றும் ரைசோபஸ்	காற்று மூலம் பரவும்	சந்தர்ப்பவாத நுண்ணுயிரி	ஆம்ப்போடேரிசின் B

XII U10 Immunology.indd 248 4/22/2020 11:22:44 AM