தங்களுக்குத் தெரியுமா?

இளைஞர்களை விட பச்சிளம் குழந்தைகள் சில தொற்றுகளுக்கு எளிதில் உள்ளாகின்றனர். பச்சிளம் குழந்தைகளின் வயிற்றில் உள்ள பொருட்கள் குறைந்த அமிலத் தன்மையை அதாவது அதிக pH மதிப்பை (இளைஞர்களை விட) பெற்றுள்ளது. இந்த pH மதிப்பு மாறுபாடு நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கு தகுந்த ஊடகமாக உள்ளன.

செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள் (PHAGOCYTIC BARRIERS):

செல் விழுங்குதல் என்பது உட்கொள்ளப்பட்ட வெளிச்செல்பொருளை அழிக்கும் இயல்பாக அமையப் பெற்ற மற்றுமொரு நோய் தடைக் காப்பாகும். மெட்சினிகாப் என்பவரால் செல் விழுங்குதல் செயல்முறை கண்டறியப்பட்டது. செல் விழுங்குதல் என்பது நுண்ணுயிரி செல்களை விழுங்குதல் மற்றும் செரித்தல் ஆகும். நுண்ணுயிரிகளை விழுங்குதல் மற்றும் செரித்தல் செயலில் பாலிமார்போ நியூக்ளியார் லீயூகோசைட்டுகள் மற்றும் மேக்ரோபேஜ்கள் என்ற இரண்டு வகையான செல்கள் முதன்மையாக ஈடுபடுகின்றன. ஈசினோபைல்கள் குறைந்தளவு ஈடுபடுகின்றன. செல்விழுங்குதல் செயல்முறை கீழ்க்கண்ட படிகளில் நிகழ்கிறது.


1
2
3
4
5
நுண்ணுயிரி
ஏற்பி
லைசோசோம்
1. இணைத்தல் மற்றும் உறிஞ்சுதல்
2. பாகோசோம் உருவாதல்
3. பாகோசோம் மற்றும் லைசோசோம் இணைந்து பாகோலைசோசோம் உருவாதல்
4. செரித்தல்
5. நுண்ணுயிர் பொருள்கள் வெளியிடல்

1. **இணைதல்**

   பேகோசைட்டுகளின் செல் சவ்வின் மீது பாக்டீரியாக்கள் இணைக்கப்படுகின்றன. சில பாக்டீரியாக்கள் பேகோசைட்டிக் செல்களுடன் எளிதல் இணைக்கின்றன. (எ.கா.) மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோஸிஸ் (*Mycobacterium tuberculosis*).

2. **பேகோசோம் உருவாக்கம்:**

   பாக்டீரியா இணைந்த பிறகு, போகோசைட்டுகள் பாக்டீரியாவை சுற்றி சூடொபோடியா மூலம் வளைக்கிறது. சூடொபோடியா செல் சவ்வினால் சூழப்பட்ட பாக்டீரியாவை கொண்டுள்ள