அறை வெப்பநிலையில் விடப்படுகிறது. பின்னர் 0.5 மி.லி போலின் வினைபொருள் சேர்க்கப்பட்டு நிறச் செறிவை 660 நானோ மீட்டரில் அளக்க வேண்டும். 660nm ல் உட்கவர்தல் Vs (µg) BSA என்ற திட்ட வரைபட வளைவினை வரைக. இந்த வரைபட வளைவிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியிலுள்ள புரதத்தின் நிறை கணக்கிடலாம்.

வ. எண்	வினைப் பொருட்கள்	B	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	மாதிரி கரைசல்	
1.	பயன்பாட்டு கரைசலின் கனஅளவு (ml)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	-	-
2.	செறிவு (mg)	0	50	100	150	200	250	-	-
3.	சோதனை கரைசலின் கனஅளவு	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
4.	NaOH யின் கனஅளவு (ml)	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	0	2.0	1.5
5.	லௌரியின் வினைபொருள் கனஅளவு (ml)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
சோதனை குழாய்களில் உள்ள கரைசல்களை நன்கு கலக்கவும்									
6.	போலின் வினைப்பொருளின் கனஅளவு (ml)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
எல்லா சோதனைக் குழாய்களையும் அரை வெப்பநிலையில் அடைக்காக்க									
7.	ஒளிச்செறிவு அடர்த்தி 660nm								

கணக்கீடு

0.5ml மாதிரி கரைசல் Y µg புரதத்தை கொண்டுள்ளது

100ml மாதிரி கரைசசில் உள்ள புரதத்தின் அளவு = 100 x Y / 0.5

= ------- µg

முடிவு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள 100ml மாதிரி கரைசல் ------- µg புரதத்தை கொண்டுள்ளது.

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 291 4/22/2020 11:35:45 AM