(c) தொடர் தொகுப்பின் தரவுகளுக்கான பெருக்குச் சராசரி

கொடுக்கப்பட்ட பிரிவு இடைவெளியின் நடுப்புள்ளி என்க

$$\text{G. M. } = \text{Antilog}\left[\frac{\sum_{i=l}^{n} f_i \log x_i}{N}\right]$$

எடுத்துக்காட்டு 5.10

பாடவாரியாக 109 மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பெருக்கு சராசரி காண்க.

மதிப்பெண்கள்	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28-32	32-36	36-40
மாணவர்கள் எண்ணிக்கை	6	10	18	30	15	12	10	6	2

தீர்வு:

மதிப்பெண்கள்	நடுப்புள்ளி (x_i)	f_i	$\log x_i$	$f_i \log x_i$
4-8	6	6	0.7782	4.6692
8-12	10	10	1.0000	10.0000
12-16	14	18	1.1461	20.6298
16-20	18	30	1.2553	37.6590
20-24	22	15	1.3424	20.1360
24-28	26	12	1.4150	16.980
28-32	30	10	1.4771	14.7710
32-36	34	6	1.5315	9.1890
36-40	38	2	1.5798	3.1596
மொத்தம்		N =109		137.1936

$$\text{G.M. } = \text{Antilog}\left[\frac{\sum_{i=l}^{n} f_i \log x_i}{N}\right]$$

$$= \text{Antilog}\left[\frac{137.1936}{109}\right] = \text{Antilog } [1.2587]$$

Ch5_11th Stats TM.indd 128 2/17/2019 11:56:12 AM