(c) தொடர் தொகுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கான இசைச் சராசரி (H.M. for Continuous data):

பிரிவு இடைவெளியின் மையப்புள்ளி x_i எனில்

$$\text{H.M.} = \frac{N}{\sum_{i=l}^{n} f_i\left(\frac{1}{x_i}\right)}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.13

பின்வரும் விவரங்களுக்கு H.M. காண்க

பங்குகள் (%)	2 – 6	6 – 10	10 – 14
கம்பெனிகளின் எண்ணிக்கை	10	12	18

தீர்வு:

பங்குகள்	நடுப்புள்ளி (x_i)	கம்பெனிகளின் எண்ணிக்கை (f_i)	தலைகீழி $(1/x_i)$	$f_i\ (1/x_i)$
2 – 6	4	10	¼	2.5
6 – 10	8	12	1/8	1.5
10 – 14	12	18	1/12	1.5
மொத்தம்		N = 40		5.5

$$\text{H.M.} = \frac{N}{\sum_{i=l}^{n} f_i\left(\frac{1}{x_i}\right)} = \frac{40}{5.5} = 7.27$$

இசைச் சராசரியின் நிறைகள்:

- இசைச் சராசரியின் நிறைகள்
- எல்லா மதிப்புகளுக்கும் இது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
- அதிகமாக பரவல் அமையும்போது இது பயன்படுகிறது.
- இது கணித செயல்பாடுகளுக்கு இணக்கமாக உள்ளது.
- இது பெரிய மதிப்புகளுக்கு குறைந்த முக்கியத்துவத்தையும், சிறிய மதிப்புகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தையும் கொடுக்கும் இடங்களில் இது பொருத்தமாக அமையும்.

Ch5_11th Stats TM.indd 131 2/17/2019 11:56:14 AM