f_2 = முகட்டுக் குழுவிலுள்ள நிகழ்வெண்ணுக்கு பிந்தைய நிகழ்வெண்

c = பிரிவிடையளவு

குறிப்புகள்:

(i) $(2f_1\text{-}f_0\text{-}f_2)$ மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எனில் முகட்டை பின்வரும் வாய்ப்பாட்டின் மூலம் பெறலாம்.

$$M_0 = l + \left(\frac{(f_1 - f_0)}{|f_1 - f_0| + |f_1 - f_2|} \times C \right)$$

(ii) முதல் பிரிவிடைக்குழுவில் முகட்டுக்குழு அமையுமானால் f_0, 0 என எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(iii) திறந்த பிரிவு இடைவெளியைக் கொண்ட பரவலில் முகடானது திறந்த பிரிவு இடைவெளியில் அமையாத வரையில், முகட்டைக் கணிப்பதில் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 5.25

ஒரு நகரத்தின் ஒரு பகுதியில் வாழும் குடும்பத்தினரின் மாத ஊதிய விவரம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. அக்குடும்பத்தினரின் மாத ஊதியத்தை முகடு வாயிலாகக் காண்க.

மாத ஊதியம் (ரூபாயில்)	0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700
எண்ணிக்கை	5	7	12	18	16	10	5

தீர்வு:

மாத ஊதியம் (ரூபாயில்)	எண்ணிக்கை (f)	
0-100	5	
100-200	7	
200-300	12	f_0
300-400	18	f_1
400-500	16	f_2
500-600	10	
600-700	5	

$$\text{முகடு} = l + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times C$$

அதிகபட்ச நிகழ்வெண் – 18, முகட்டு பிரிவு இடைவெளி : 300-400

இங்கு, $l = 300$, $f_0 = 12$, $f_1 = 18$, $f_2 = 16$,

Ch5_11th Stats TM.indd 143 2/17/2019 11:56:19 AM