பகுப்பாய்வு அட்டவணை:

குழுக்கள்	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1					1			
2					1	1		
3				1	1			
4				1	1	1		
5		1	1	1				
6			1	1	1			
மொத்தம்		1	2	4	5	2		

அதிகபட்ச மதிப்பு 20 – 25 என்ற பிரிவு இடைவெளியில் அமைவதால் அதுவே முகட்டு இடைவெளியாகும்.

$$\text{முகடு} = l + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times C$$

$l = 20,\ f_0 = 16,\ f_1 = 17,\ f_2 = 15$

$$= 20 + \frac{17 - 16}{2 \times 17 - 16 - 15} \times C$$

$$= 20 + \frac{1}{34 - 31} \times 5$$

$$= 20 + \frac{5}{3} = 20 + 1.67 = 21.67$$

$$\text{முகடு} = 21.67$$

(d) வரைபடம் மூலம் முகடு காணுதல்

(i) கொடுக்கப்பட்ட பரவலுக்கு நிகழ்வுச் செவ்வகம் வரைக.

(ii) படத்தில் காட்டியுள்ளபடி மிகப் பெரிய செவ்வகத்தின் (முகட்டுச் செவ்வகம்) வலப்பக்க உயர முனையையும் முந்தைய செவ்வகத்தின் வலப்பக்க செவ்வகத்தின் உயர முனையை நேர்க்கோட்டால் இணைக்க. அதேபோல் முகட்டுச் செவ்வகத்தின் இடப்பக்க உயர முனையையும் அச்செவ்வகத்தின் பிந்தைய செவ்வகத்தின் இடப்பக்க உயர முனையையும் நேர்க்கோட்டால் இணைக்க.

(iii) இரு நேர்க்கோடுகள் வெட்டுமிடத்திலிருந்து X அச்சுக்கு ஒரு செங்குத்துக் கோடு வரைக.

(iv) அச்செங்குத்துக் கோடு X அச்சை சந்திக்கும் புள்ளியே முகடு மதிப்பு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.27

வரைபடம் மூலம் கீழ்க்கண்ட நிகழ்வெண் பரவலுக்கு முகடு காண்க.

குழுக்கள்	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
நிகழ்வெண்கள்	5	8	12	7	5	3

Ch5_11th Stats TM.indd 146 2/17/2019 11:56:21 AM