$$Q_3 = 3\left(\frac{n+1}{4}\right) \text{ ஆவது உறுப்பு}$$

$$= 3 \times (2.25) \text{ ஆவது உறுப்பு}$$

$$= 6.75 \text{ ஆவது உறுப்பு}$$

= 6 ஆவது உறுப்பு + 0.75 (7 ஆவது உறுப்பு – 6 ஆவது உறுப்பு)

$$= 52 + (0.75)\ (57 - 52)$$

$$= 52 + 3.75$$

$$Q_3 = 55.75$$

தனித்த நிகழ்வெண் பரவல்களுக்கு கால்மானங்கள் காணுதல்

கால்மானங்களைக் காண கீழ்க்கண்ட படிகளை பயன்படுத்தலாம்.

படி 1 : முதலில் குவிவு நிகழ்வெண்களைக் காண்க.

படி 2 : $\left(\frac{N+1}{4}\right)$ காண்க.

படி 3 : குவிவு நிகழ்வெண்கள் உள்ள நிரலில் $\left(\frac{N+1}{4}\right)$, இன் மதிப்பைவிட அதற்கு அடுத்த அதிக மதிப்புள்ள குவிவு நிகழ்வெண் உள்ள எண்ணுக்கு உரிய x Q_1 மதிப்பு ஆகும்.

படி 4 : $3\left(\frac{N+1}{4}\right)$ காண்க.

படி 5 : குவிவு நிகழ்வெண்கள் உள்ள நிரலில் $3\left(\frac{N+1}{4}\right)$ இன் மதிப்பை விட அதற்கு அடுத்த அதிக மதிப்புள்ள குவிவு நிகழ்வெண் உள்ள எண்ணுக்கு உரிய x இல் உள்ள எண்ணே $Q3$ மதிப்பு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.31

ஒரு கிராமத்தில் உள்ள 543 பேரின் வயது விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கு Q_1 மற்றும் Q_3 ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

வயது	20	30	40	50	60	70	80
உறுப்பினர் எண்ணிக்கை	3	61	132	153	140	51	3

Ch5_11th Stats TM.indd 150 2/17/2019 11:56:24 AM