நன்மைகள்:

- தரவு மதிப்புகளின் விளிம்பு மதிப்புகளால் பாதிக்கப்படாது (மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய)
- திறந்தவெளி பிரிவு விவரங்கள் சிதறலுக்கான பொருத்தமான அளவையாகும்.
- கோட்ட அளவு அதிகமுள்ள பரவலுக்கு இது உகந்த அளவையாகும்.

வரம்புகள்:

- அரை இடைக்கால்மான வீச்சு (Q.D) இடைப்பட்ட 50% விவரங்களை மட்டும் உள்ளடக்கி மற்ற விவரங்களைக் கணக்கிடுவதில்லை. எனவே இது ஓர் சிறந்த சிதறல் அளவை அல்ல.
- கணக்கியல் முறையில் பயன்படாது
- இது மாதிரிமுறை ஏற்றத் தாழ்வுகளால் பாதிக்கப்படுகிறது.
- அரை இடைக்கால்மான வீச்சு (Q.D) ஓர் இடம் சார்ந்த அளவை, மேலும் எந்த ஓர் சராசரியுடன் தொடர்புபடுத்த இயலாது.

6.3.3 சராசரி விலக்கம்:

ஓரு மைய அளவையிலிருந்து தொடரின் மதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் விலக்கங்களின் சராசரியே சராசரி விலக்கமாகும் (MD) எல்லா விலக்கங்களும் நேரிடை மதிப்புகளாகவே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.

மைய அளவைகள் சராசரி அல்லது இடைநிலையாக இருக்கலாம். மைய அளவை சராசரியாக (இடைநிலை) இருந்தால் சராசரி விலக்கம் சராசரி (இடைநிலை)யிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.

சராசரி விலக்கம் MD (சராசரியைப் பொறுத்து) $= \frac{\sum|D|}{n}$ $\quad D = (x - \bar{x})$

சராசரி விலக்கம் MD (இடைநிலையைப் பொறுத்து) $= \frac{\sum|Dm|}{n} = D_m =$ $x -$ இடைநிலை

சராசரி விலக்கத்தின் ஒப்பீட்டு அளவை சராசரி விலக்கக்கெழுவாகும் (C.M.D.).

$$\text{சராசரி விலக்கக்கெழு} = \frac{\text{MD. (சராசரி (அ) இடைநிலையைப் பொறுத்து)}}{\text{சராசரி (அ) இடைநிலை}}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.4

ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஒரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 10 குழந்தைகளின் எடை விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அவ்விவரங்களுக்கு சராசரியிலிருந்தும், இடைநிலையிலிருந்தும் சராசரி விலக்கம் காண்க. மேலும் அவற்றின் கெழுக்களைக் காண்க.

7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 9, 18

Ch6_11th Stats TM.indd 167 2/17/2019 11:57:16 AM