8.2.1 கணித நிகழ்தகவு (பாரம்பரிய / முந்தைய அணுகுமுறை)

ஒரு முடிவுறு சமவாய்ப்பு சோதனையின் கூறுவெளி S எனில் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி A இன் நிகழ்தகவு

$$P(A) = \frac{\text{Aக்கு சாதகமான உறுப்புக்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{Sஇல் உள்ள உறுப்புக்களின் எண்ணிக்கை}} = \frac{n(A)}{n(S)} .$$


கோட்பாடு அணுகுமுறை அறிமுகப்படுத்தும் வரை மேலே உள்ள வரையறை பயன்படுத்தப்பட்டது. எனவே இது 'நிகழ்தகவின் பாரம்பரிய வரையறை' எனப்படுகிறது. சோதனை செய்யாமலேயே சோதனையைப் பற்றிய முன் அனுபவத்தைக் கொண்டு, கணக்கிடுவதால் இது "முந்தைய நிகழ்தகவு" எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.5

52 சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டுக் கட்டிலிருந்து ஒரு ராஜா சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புக் காண்க.

தீர்வு:

சீட்டுக்கட்டில் 52 சீட்டுகள் உள்ளன. $[n(s) = 52]$ அது படம் 8.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம். 8.2 சீட்டுக்கட்டு

ராஜா சீட்டு ஒன்றை எடுக்கும் நிகழ்ச்சி A என்க

ராஜா சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை $n(A) = 4$ சீட்டுகள்

எனவே ராஜா சீட்டு ஒன்றை எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{52}$

எடுத்துக்காட்டு 8.6

ஒரு பையில் 7 சிவப்பு, 12 நீலம் மற்றும் 4 பச்சைப் பந்துகள் உள்ளன. எடுக்கப்பட்ட 3 பந்துகள் நீல நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க

Ch8_11th Stats TM.indd 227 2/17/2019 12:03:07 PM