1 ஸ்பேட் சீட்டு எடுக்கும் வழிகள் $= 13C_1 = 13$

2 கிளாவர் சீட்டுகள் எடுக்கும் வழிகள் $= 13C_2 = 78$

ஒரு ஸ்பேட் மற்றும் 2 கிளாவர் சீட்டு எடுக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஒரே சமயத்தில் நடக்க ,

1 $= n(A_2) = 13 \times 78 = 1014$

$$P(A_2) = \frac{n(A_2)}{n(S)} = \frac{13 \times 78}{22100}$$

$$P(A_2) = \frac{1014}{22100} = \frac{507}{11050}$$

(c) A_3 = 1 ஸ்பேட், 1 கிளாவர் மற்றும் 1 ஹார்டின் சீட்டுகள் எடுத்தல்

1 ஸ்பேட், 1 கிளாவர் மற்றும் 1 ஹார்டின் சீட்டுகள் எடுக்கும் வழிகள்

$$n(A_3) = 13C_1 \times 13C_1 \times 13C_1 = 13 \times 13 \times 13$$

$$P(A_3) = \frac{n(A_3)}{n(S)} = \frac{13 \times 13 \times 13}{22100}$$

$$P(A_3) = \frac{2197}{22100}.$$


8.4 நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம்

தேற்றம் 8.4 : (இரு நிகழ்ச்சிக்கான நிகழ்தகவு கூட்டல் தேற்றம்)

ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் A மற்றும் B என்பன ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிகள் எனில்

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

நிரூபணம் :



படம் 8.9 வெண்படம்

ஏதேனும் இரு நிகழ்ச்சிக்கு A மற்றும் B, படம் 8.9 ல் நிழலிட்ட பகுதி $A \cup B$ என்ற நிகழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

$$A \cup B = A \cup (B - (A \cap B))$$

நிகழ்ச்சி A மற்றும் $B-(A \cap B)$ ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகும்.

Ch8_11th Stats TM.indd 235 2/17/2019 12:03:18 PM