எடுத்துக்காட்டு 8.17

இருபகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன நிகழ்ச்சிகள், A, B மற்றும் C பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

A : முதல் பகடையில் 2 கிடைத்தல்,

B : இரண்டாவது பகடையில் 2 கிடைத்தல்

C : இரண்டு முகங்களின் கூடுதல் ஒரு இரட்டை எண் எனில். C என்ற நிகழ்ச்சிகள் ஜோடியாக சார்பற்றவைகள் ஆனால் மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றாக சோந்து இருக்கும்போது சார்பற்றவை அல்ல. என நிறுவுக ?

தீர்வு:

ஒரு ஜோடி பகடை உருட்டுதலின் கூறுவெளி

$$S = \{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),$$
$$(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),$$
$$(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),$$
$$(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),$$
$$(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),$$
$$(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \}$$

$$n(S) = 36$$

இந்த நிகழ்ச்சிகளின் சாதகமான விளைவுகள் பின்வருமாறு

$$A = \{ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) \}$$

$$n(A) = 6$$

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$B = \{ (1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2) \}$$

$$n(B) = 6$$

$$P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$C = \{ (1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (2,6), (3,1), (3,3), (3,5),$$
$$(4,2), (4,4), (4,6), (5,1), (5,3), (5,5), (6,2), (6,4), (6,6) \}$$

$$n(C) = 18$$

Ch8_11th Stats TM.indd 243 2/17/2019 12:03:30 PM