வரையறுக்கப்பட்ட விதியின்படி

$X(1) = 1,\ X(2) = 2, X(3) = 3, X(4)=4,\ X(5)=5$ மற்றும் $X(6)=6$

எனவே, வாய்ப்பு மாறி X ஆனது 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஆகிய மதிப்புகளைப் பெறுகிறது.

வாய்ப்பு மாறி X ஐ உணர்ந்து கொள்ள இம்மதிப்புகள் உதவுகின்றன.

(ii) வாய்ப்பு சோதனை : ஒரே நேரத்தில் இரு நாணயங்கள் சுண்டப்படுதல்

கூறுவெளி : $S=\{HH, HT, TH, TT\}$

வாய்ப்பு மாறி X வரையறை : X தலைகளின் எண்ணிக்கை

கூறுவெளி ω	HH	HT	TH	TT
X (ω)	2	1	1	0

இங்கு வாய்ப்பு மாறி X இன் மதிப்புகள் 0, 1, 2 .

(iii) சோதனை : ஒரே நேரத்தில் இரு பகடைகள் உருட்டப்படுதலின்

கூறுவெளி : 36 புள்ளிகளைக் கொண்டது

கூறுவெளி : $\{(1, 1),(1, 2),(1, 3),\ldots(6, 6)\}$

வரையறுக்கப்பட்ட விதி : (விதி ஒதுக்கீடு) X – பகடையில் தோன்றும் எண்களின் கூடுதல் எனில் $X_{ij} = i + j$

i - முதல் பகடையில் தோன்றும் எண், j – இரண்டாம் பகடையில் தோன்றும் எண் எனில், வாய்ப்பு மாதிரி பெறும் மதிப்புகள் 2, 3, 4 . .... 12.

X ன் வீச்சு $\{2, 3, 4..... 12\}$

9.2 தனித்த வாய்ப்பு மாறி மற்றும் தொடர் வாய்ப்பு மாறி

வாய்ப்பு மாறிகள் அவை பெறும் மதிப்பினைக் கொண்டு தனித்த வாய்ப்பு மாறி அல்லது தொடர் வாய்ப்பு மாறி என இரு வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

9.2.1 தனித்த வாய்ப்பு மாறி

வாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள் முடிவுறுவதாகவோ அல்லது எண்ணிடத்தக்க அளவுள்ள தாகவோ இருப்பின் தனித்த வாய்ப்பு மாறி எனப்படும்.

Ch9_11th Stats TM.indd 260 2/17/2019 12:08:56 PM