இ) சல்பைடை அதன் ஆக்ஸைடாக வறுத்தல் என்பது ஒரு சாதகமான வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறையாகும்.

ஈ) உலோக சல்பைடுகளுக்கு, கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆகியன தகுந்த பொருத்தமான ஒடுக்கும் காரணிகளாகும்.

7. கலம் –Iல் உள்ளனவற்றைக் கலம் –II ல் உள்ளனவற்றுடன் பொருத்தித் தகுந்த விடையினைத் தெரிவு செய்க.

| கலம் –I | | கலம் -II | |
|---|---|---|---|
| A | சயனைடு செயல்முறை | (i) | மிகத்தூய்மையான Ge |
| B | நுரை மிதத்தல் செயல்முறை | (ii) | ZnS தாதுவை அடர்பித்தல் |
| C | மின்னாற் ஒடுக்குதல் | (iii) | Al பிரித்தெடுத்தல் |
| D | புலத்தூய்மையாக்கல் | (iv) | Au பிரித்தெடுத்தல் |
| | | (v) | Ni ஐத் தூய்மையாக்குதல் |

| | A | B | C | B |
|---|---|---|---|---|
| (அ) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (ஆ) | (iii) | (iv) | (v) | (i) |
| (இ) | (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (ஈ) | (ii) | (iii) | (i) | (v) |

8. உல்ப்ரமைட் (Worframite) தாதுவை வெள்ளீயக்கல்லில் (tinstone) இருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை

அ) உருக்குதல் ஆ) காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல்

இ) வறுத்தல் ஈ) மின்காந்தப் பிரிப்பு முறை

9. பின்வருவனவற்றுள் நிகழ வாய்ப்பில்லாத வினை எது?

அ) $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$

ஆ) $Cu(s) + Zn^{2+}(aq) \longrightarrow Zn(s) + Cu^{2+}(aq)$

இ) $Cu(s) + 2Ag^{+}(aq) \longrightarrow 2Ag(s) + Cu^{2+}(aq)$

ஈ) $Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Cu(s) + Fe^{2+}(aq)$

10. பின்வருவனவற்றுள் எத்தனிம பிரித்தெடுத்தலின் மின்வேதி முறை பயன்படுகிறது?

அ) இரும்பு ஆ) லெட் இ) சோடியம் ஈ) சில்வர்



XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 23 04-01-2021 14:42:14