13. பின்வரும் வினையின் அதிக அளவு உருவாகும் முதன்மை விளைபொருள்

$(CH_3)_2 C = CH_2 \xrightarrow{ICl}$


அ) 2- குளோரோ -1- அயடோ -2- மெத்தில் புரப்பேன்

ஆ) 1- குளோரோ -2- அயடோ -2- மெத்தில் புரப்பேன்

இ) 1,2- டை குளோரோ -2- மெத்தில் புரப்பேன்

ஈ) 1,2- டை அயடோ -2- மெத்தில் புரப்பேன்

14. பின்வரும் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர்



அ) டிரான்ஸ் -2- குளோரோ -3- அயடோ -2- பென்டீன்

ஆ) சிஸ் -3- அயடோ -4- குளோரோ -3- பென்டேன்

இ) டிரான்ஸ் -3- அயடோ -4- குளோரோ -3- பென்டீன்

ஈ) சிஸ் -2- குளோரோ 3- அயடோ -2- பென்டீன்

15. சிஸ் – 2 – பியூட்டீன் மற்றும் டிரான்ஸ் -2- பியூட்டீன் ஆகியன


அ) வச அமைப்பு மாற்றிங்கள்


ஆ) கட்டமைப்பு மாற்றியங்கள்


இ) புறவெளி மாற்றிங்கள்


ஈ) ஒளி சுழ்றச்சி மாற்றிங்கள்


16. பின்வரும் வினையில் சேர்மம் (A) ஐக் கண்டறிக











17. $CH_2 - CH_2 \xrightarrow{(A)} CH \equiv CH$

Br Br இங்கு Aஎன்பது

அ) Zn ஆ) அடர் H_2SO_4

இ) ஆல்கஹால் கலந்த. KOH

ஈ) நீர்த்த H_2SO_4

18. அடர் H_2SO_4 மற்றும் HNO_3 ஆகிய நைட்ரோ ஏற்ற கலவையால் பென்சீன் நைட்ரோ ஏற்றம் அடையும் வினையைக் கருதுக. வினைக்கலவையில் அதிக அளவு $KHSO_4$ சேர்க்கப்படின், நைட்ரோ ஏற்ற வினையின் வேகம்

அ) மாற்றமடையாது


ஆ) இரு மடங்காகும்

இ) அதிகமாகும்

ஈ) குறையும்

19. பின்வரும் எம்மூலக்கூறுகளில் அனைத்து அணுக்களும் சமதளத்தில் உள்ளன.

அ) 

ஆ) 

Unit 13 - jagan.indd 242 27-01-2021 15:44:32