விடைக் குறிப்புகள்

அலகு 8
வேதிச்சமநிலை
தன் மதிப்பீடு

1.

	Fe^{3+}	SCN^-	$[Fe(SCN)^{2+}$
ஆரம்ப செறிவு (M)	1×10^{-3} (10×10^{-4})	8×10^{-4}	–
வினைப்பட்டது	2×10^{-4}	2×10^{-4}	–
சமநிலை செறிவு	8×10^{-4}	6×10^{-4}	2×10^{-4}

$$K_{eq} = \frac{[Fe(SCN)]^{2+}}{[Fe^{3+}][SCN^-]}$$

$$= \frac{2 \times 10^{-4}\ M}{8 \times 10^{-4}\ M \times 6 \times 10^{-4}\ M}$$

$$= 0.0416 \times 10^4$$

$$K_{eq} = 4.16 \times 10^2\ M^{-1}$$

2. $2\ NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

	NO_2	O_2	NO_2
ஆரம்ப பகுதி அழுத்தம்	1	1	–
வினைப்பட்டது	0.96	0.48	–
சமநிலை அழுத்தம்	0.04	0.52	0.96

$$K_P = \frac{P^2_{NO_2}}{P^2_{NO} \cdot Po_2}$$

$$= \frac{0.96 \times 0.96}{0.04 \times 0.04 \times 0.52}$$

$$= 11.07 \times 10^2\ (atm)^{-1}$$

3. $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$

கொடுக்கப்பட்டவை $K_p = 2.7$

$[CO] = 0.13$, $[H_2O] = 0.56$

$[CO_2] = 0.78$; $[H_2] = 0.28$

$V = 2L$

$K_P = K_C (RT)$

$2.7 = K_C (RT)^o$

$K_C = 2.7$

$$Q_C = \frac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]}$$

$$= \frac{\left(\frac{0.78}{2}\right)\left(\frac{0.28}{2}\right)}{\left(\frac{0.13}{2}\right)\left(\frac{0.56}{2}\right)}$$

$Q = 3$

$Q > K_C$, எனவே வினை பின்னோக்கிய திசையில் நிகழும்.

4. $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$

கொடுக்கப்பட்டவை $[PCl_5]_{initial} = 1$ mol; $V = 1\ dm^3$; $K_C = 2$

	PCl_5	PCl_3	Cl_2
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	1	–	–
வினைப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	–	–
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	1–x	x	x
சமநிலை செறிவு	$\frac{1-x}{1}$	$\frac{x}{1}$	$\frac{x}{1}$

$$K_C = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]}$$

$$2 = \frac{x \times x}{(1-x)}$$

$2 - 2x = x^2$

$x^2 + 2x - 2 = 0$

$ax^2 + bx + c = 0$,
என்ற இருபடி
சமன்பாட்டின் தீர்வுகள்

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Key answers -jagan.indd 315 27-01-2021 16:07:06