**அட்டவணை 10.7 ICMR கொழுப்பிற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து அளவுகள்**

| தொகுதி | விவரங்கள் | கொழுப்புத்தேவைகி/நாள் |
|---|---|---|
| ஆண் | எளிதான வேலை | 25 |
| | நடுத்தரமான வேலை | 30 |
| | கடினமான வேலை | 40 |
| பெண் | எளிதான வேலை | 20 |
| | நடுத்தரமான வேலை | 25 |
| | கடினமான வேலை | 30 |
| | கர்ப்பிணிப் பெண் | 30 |
| | பாலூட்டும் தாய்(0–6 மாதங்கள் | 30 |
| | பாலூட்டும் தாய்(6–12 மாதங்கள் | 30 |
| குழவிப்பருவம் | 0 – 6 மாதங்கள் | - |
| | 6 – 12 மாதங்கள் | 19 |
| குழந்தைகள் | 1 – 3 வயது | 27 |
| | 4 – 6 வயது | 25 |
| | 7 - 9 வயது | 30 |
| சிறுவர் | 10 – 12 வயது | 35 |
| சிறுமி | 10 – 12 வயது | 35 |
| சிறுவர் | 13 – 15 வயது | 45 |
| சிறுமி | 13 – 15 வயது | 40 |
| சிறுவர் | 16 – 17 வயது | 50 |
| சிறுமி | 16 – 17 வயது | 35 |

உணவுகளை அளிப்பதன் மூலம் தோலின் இயல்பு நிலையை பெறலாம்.

ஆ) அதிகப்படியான கொழுப்பினால் ஏற்படும் விளைவுகள்

1. தேவைக்குஅதிகமானசக்திபெறப்பட்டதால் உடல் எடை கூடுகிறது. இத்துடன் அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேடுகளும் கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு உடலில் சேமிக்கப்படுவதால் உடல் எடை அதிகரிக்கிறது.
2. உணவு செரிமானம் மற்றும் சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சும் தன்மையின் வேகமும் குறைகிறது.
3. கால்சியத்தை உடல் உட்கிரகிக்கும் செயல்பாடு பாதிப்படைகிறது. கால்சியமானது கரையாத கால்சியம் சோப்பாக மாறிவிடுகிறது. இவை குடல் சுவர் உறிஞ்ச இயலாத நிலையில் உள்ளன.
4. தேவையான அளவு கார்போஹைட்ரேட் மூலமாக கொழுப்பு ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையாவிடில் கீடோசிஸ் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது.



NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 181 22-01-2020 11:42:23