


படம்3.1 தாவரத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளிருந்து தோன்றும் காய்கறிகள்

3.2. காய்கறிகளின் வகைப்பாடு

காய்கறிகள், அவை சார்ந்து உண்ணப்படும் தாவரப்பகுதிகள், அவை நிறங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

3.3 காய்கறிகளிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவுகள்

- வேர்கள் மற்றும் கிழங்குகளான கேரட், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு பெருமளவில் மாவுச்சத்து கொண்டுள்ளன. ஆகையால், உணவின் சக்தி பங்களிப்பில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன.
- கேரட் அதிக அளவில் கரோட்டீன் (உயிர்ச்சத்துA) கொண்டுள்ளது. உருளைக்கிழங்கு, சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு ஆகியனவற்றில் உயிர்ச்சத்து B_6, C, பொட்டாசியம் மற்றும் இரும்பு அதிக அளவில் கொண்டுள்ளது.
- உயிர்ச்சத்துகள் மற்றும் தாதுக்களின் நல்ல உணவு ஆதாரமாக கீரை வகைகள் உள்ளன. இவற்றில் கரோட்டீன்கள் எனும் எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உயிர்ச்சத்து A சிறந்த அளவில் உள்ளன.
- மேலும் கீரை வகைகள், ரிபோஃபிளேவின், ஃபோலிக் அமிலம், கரோட்டீன் போன்ற உயிர்ச்சத்துகளின் ஆதார உணவாகும். ஆனால், உலர்தல் மற்றும் வாடுதலினால் உயிர்ச்சத்து B வகைகளின் அளவுகள் குறைந்து விடுகின்றது.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-3_045-057.indd 47 22-01-2020 11:32:09