




படம். 4.17

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| $-1$ | $-\frac{\pi}{4}$ |
| $0$ | $0$ |
| $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-\frac{\pi}{6}$ |
| $1$ | $\frac{\pi}{4}$ |




படம். 4.18

## குறிப்பு

(i) நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு திடமாக ஏறும் சார்பு மற்றும் $(-\infty, \infty)$ எனும் சார்பகத்தில் தொடர்ச்சியானது.

(ii) $y=\tan^{-1}x$ -ன் வரைபடம் ஆதி வழியாகச் செல்கிறது.

(iii) ஆதியைப் பொறுத்து வளைவரை சமச்சீராக இருப்பதால் சார்பு $y=\tan^{-1}x$ ஆனது ஒரு ஒற்றைச் சார்பாகும்.

### எடுத்துக்காட்டு 4.8

முதன்மை மதிப்பு காண்க: $\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$.

### தீர்வு

$\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)=y$ என்க. எனவே, $\tan y=\sqrt{3}$. ஆகையால், $y=\frac{\pi}{3}$. ஏனெனில் $\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

எனவே, $\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$ ன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{3}$ ஆகும்.

### எடுத்துக்காட்டு 4.9

மதிப்பு காண்க (i) $\tan^{-1}\left(-\sqrt{3}\right)$ (ii) $\tan^{-1}\left(\tan\frac{3\pi}{5}\right)$ (iii) $\tan\left(\tan^{-1}(2019)\right)$

### தீர்வு

(i) $\tan^{-1}\left(-\sqrt{3}\right)=\tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)=-\frac{\pi}{3}$, ஏனெனில் $-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

(ii) $\tan^{-1}\left(\tan\frac{3\pi}{5}\right)$.

$\tan\theta=\tan\frac{3\pi}{5}$ எனுமாறு $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ ஐ நாம் கண்டறிய வேண்டும்.

தொடுகோட்டுச் சார்பின் காலம் $\pi$ என்பதால், $\tan\frac{3\pi}{5}=\tan\left(\frac{3\pi}{5}-\pi\right)=\tan\left(-\frac{2\pi}{5}\right)$.

எனவே, $\tan^{-1}\left(\tan\frac{3\pi}{5}\right)=\tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{2\pi}{5}\right)\right)=-\frac{2\pi}{5}$, ஏனெனில் $-\frac{2\pi}{5}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$,

(iii) $\tan\left(\tan^{-1}x\right)=x, x\in\mathbb{R}$ என்பதால், $\tan\left(\tan^{-1}(2019)\right)=2019$ ஆகும்.



Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 161 05-02-2020 18:23:33