

சமன்பாடு	மையம்	நெட்டச்சு	முனைகள்	குவியங்கள்
$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \boxed{a^2 > b^2}$  படம் 5.24 (a) நெட்டச்சு x-அச்சுக்கு இணை குவியங்கள் மையத்திலிருந்து இடப்பக்கமும், வலப்பக்கமும் c அலகுகள் தூரத்தில் இருக்கும். இங்கு $c^2 = a^2 - b^2$.	(h,k)	x-அச்சுக்கு இணை	$(h-a,k)$ $(h+a,k)$	$(h-c,k)$ $(h+c,k)$
$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1 \quad \boxed{a^2 > b^2}$  படம் 5.25 (b) நெட்டச்சு y-அச்சுக்கு இணை குவியங்கள் மையத்திலிருந்து இடப்பக்கமும், வலப்பக்கமும் c அலகுகள் தூரத்தில் இருக்கும். இங்கு $c^2 = a^2 - b^2$.	(h,k)	y-அச்சுக்கு இணை	$(h,k-a)$ $(h,k+a)$	$(h,k-c)$ $(h,k+c)$

தேற்றம் 5.5

நீள்வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் குவித்தொலைவுகளின் கூடுதல் அதன் நெட்டச்சின் நீளத்திற்குச் சமம்.


நிரூபணம்

$P(x,y)$ என்பது நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$-ன் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

P-ன் வழியாக l, l' இயக்குவரைகளுக்கு செங்குத்தாக MM' வரைக.

x-அச்சுக்கு செங்குத்தாக PN வரைக.

வரையறையிலிருந்து



படம் 5.26

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 206 05-02-2020 18:36:04