**அட்டவணை 1.2 அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றின் SI அலகுகளும்.**

| அடிப்படை அளவுகள் | SI அலகுகள் | | |
|---|---|---|---|
| | அலகு | குறியீடு | வரையறை |
| காலம் | வினாடி | $s$ | சீசியம் 133– அணுவின் இரு ஆற்றல் நிலைகளின் மீநுண்ணிய மட்டங்களுக்கிடையே பரிமாற்றம் நிகழ்வதால் ஏற்படும் கதிர்வீச்சின் அலைவு காலத்தின் 9,192,631,770 மடங்கு ஒரு நொடியாகும் (1967) |
| மின்னோட்டம் | ஆம்பியர் | $A$ | வெற்றிடத்தில், ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்ட புறக்கணிக்கத்தக்க குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு உடைய இரு முடிவிலா நீளங்கள் உடைய நேரான இணைக்கடத்திகள் வழியே, பாயும் சீரான மின்னோட்டம் அவ்விரு கடத்திகளியிடையே ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் $2\times10^{-7}\,N\,m^{-1}$ விசையை ஏற்படுத்தினால், அம்மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் எனப்படும் (1948) |
| வெப்பநிலை | கெல்வின் | $K$ | நீரின் முப்புள்ளியின்* (Triple point) வெப்ப இயக்கவியல் வெப்பநிலையில் $\frac{1}{273.16}$ பின்னப்பகுதி ஒரு கெல்வின் ஆகும் (1967) |
| பொருளின் அளவு | மோல் | $mol$ | 0.012 கிலோகிராம் தூய கார்பன் – 12 இல் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான பல துகள்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவு ஒரு மோல் எனப்படும். (1971) |
| ஒளிச்செறிவு | கேண்டிலா | $cd$ | $5.4\times10^{14}\,Hz$ அதிர்வெண் உடைய ஒளிமூலம் உமிழும் ஒற்றை நிறக் கதிர்வீச்சின் செறிவு, ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் $\frac{1}{683}$ வாட்/ஸ்ரேடியன் எனில் அத்திசையில் ஒளிச்செறிவு ஒரு கேண்டிலா ஆகும். (1979) |

* நீரின் முப்புள்ளி என்பது தெவிட்டு நீராவி, தூயநீர் மற்றும் உருகும் பனிக்கட்டி ஆகிய மூன்றும் சமநிலையில் உள்ளபோது உள்ள வெப்பநிலை ஆகும். நீரின் முப்புள்ளி வெப்பநிலை 273.16 K

**அட்டவணை 1.3 வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும்**

| இயற்பியல் அளவு | சமன்பாடு | அலகு |
|---|---|---|
| தளக்கோணம் | வட்டவில் / ஆரம் | rad |
| திண்மக்கோணம் | மேற்பரப்பு/ஆரம்$^2$ | sr |
| பரப்பு (செவ்வகம்) | நீளம் × அகலம் | $m^2$ |
| கனஅளவு அல்லது பருமன் | பரப்பு × உயரம் | $m^3$ |
| திசைவேகம் | இடப்பெயர்ச்சி/ காலம் | $m\ s^{-1}$ |
| முடுக்கம் | திசைவேகம் / காலம் | $m\ s^{-2}$ |



UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 10 28-01-2020 14:24:35