


எடுத்துக்காட்டுகள்




அசிட்டோன் புரப்பன் - 2 - ஆல்



பென்சாயிக் அமிலம் பீனைல் மெத்தனால் (பென்சைல் ஆல்கஹால்)




எத்தில் எத்தனாயேட் (எத்தில் அசிட்டேட்) எத்தனால்



குரோட்டனால்டிஹைடு (பியூட்-2- ஈனால்) குரோட்டைல் ஆல்கஹால் (பியூட்-2 - ஈன் -1- ஆல்)


இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட வினைசெயல் தொகுதிகள் ஒரு மூலக்கூறில் காணப்படின் அதிக வினைத்திறனுடைய தொகுதியை ஒடுக்கமடையச் செய்ய சற்றே வீரியம் குறைந்த சோடியம் போரோஹைட்ரைடு ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சேர்மம் கார்பனைல் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலத் தொகுதி ஆகிய இரண்டினையும் கொண்டிருக்குமாயின், இந்த ஒடுக்கும் காரணி கார்பனைல் தொகுதியை ஒடுக்கும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.



4- அல்கைல் - 4 - ஹைட்ராக்ஸி பியூட்டனாயிக் அமிலம்

கிளைக்காலைத் தயாரித்தல்

எத்திலீனை குளிர்ந்த காரம் கலந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை (பேயரின் காரணி) பயன்படுத்தி ஹைட்ராக்சிலேற்றம் செய்யும் போது எத்திலின் கிளைக்கால் உருவாகிறது என நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்துள்ளோம்.



ஈத்தீன் எத்தன் -1, 2 - டைஆல்

XII U11-Hydroxy compounds.indd 116 18-01-2021 15:31:21