
மூவிணைய ஆல்கஹால்களிலிருந்து ஆல்கைல் ஹாலைடுகள் உருவாகும் வினை S_N1 வினை வழிமுறையை பின்பற்றுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்



2- மெத்தில் புரப்பன் -2- ஆல்

2- மெத்தில் புரப் -1- ஈன்

2- புரோமோ -2- மெத்தில் புரப்பேன்

இவ்வினையில் உருவாகும் கார்பன் நேர் அயனி நீக்க வினைக்கு உட்பட்டு ஆல்கீனை உருவாக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. எனினும், உருவாகும் ஆல்கீன் மீளவும் HBr உடன் சேர்க்கை வினை புரிந்து பதிலீடு அடைந்த விளைபொருளைத் தருகிறது.


ஆல்கஹாலை ஆல்கைல் ஹாலைடாக மாற்றும் பிற முறைகள்

PCl_3, PBr_3 போன்ற வினைபொருட்களைப் பயன்படுத்தியும், ஆல்கஹால்களை ஆல்கைல் ஹாலைடுகளாக மாற்ற இயலும்

$$CH_3CH_2\,OH \xrightarrow[\text{பிரிடின்}]{PCl_3} CH_3CH_2\,Cl$$

எத்தனால் — குளோரோஈத்தேன்

வினைவழிமுறை : பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடின் மீதான S_N2 வினை குளோரோ ஈத்தேன்.



குளோரோ ஈத்தேன்

ஒரு ஆல்கஹால் ஆல்கைல் ஹைலைடாக மாற்றப்படுவதும் தயோனைல் குளோரைடைப் பயன்படுத்தி செயல்படுத்தப்படலாம்

$$CH_3-OH + SOCl_2 \xrightarrow{\text{பிரிடின்}} CH_3-Cl + HCl + SO_2$$

மெத்தனால் — தயோனைல் குளோரைடு — குளோரோ மீத்தேன்

XII U11-Hydroxy compounds.indd 121 18-01-2021 15:31:25