மிகுந்த தைராய்டு சுரப்பு மற்றும் செல்களின் அபரிமிதமான வளர்ச்சி போன்ற நோய் பாதிப்புகளிலும் ரைபோஃபிளேவின் பற்றாக்குறை காணப்படுகிறது.


நீரில் கரையக்கூடிய உயிர்ச்சத்துக்கள்
ரைபோஃபிளேவின் (உயிர்ச்சத்து B2) குறைபாடுகள்
ஏரைபோஃபிளேவினோஸிஸ்



டெர்மடைட்டிஸ் ஃபோட்டோஃபோபியா கீலோஸிஸ்



கிளாஸைட்டிஸ்



கார்னியா சிவப்படைதல்


இ) **நயாசின்** – முன்பு நிக்கோடினிக் அமிலம் என அறியப்பட்டது. நயாசின் உயிர்ச்சத்து, நிக்கோட்டினிக் அமிலம் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தினால் பெறப்படுகிறது. உணவு ஆதாரங்களை தவிர, நியாசின் உயிர்ச்சத்தானது இன்றியமையாத அமினோ அமிலமான டிரிப்டோபென் (60 mg) லிருந்தும் நயாசின்னாக(1mg) மாற்றப்பட்டும் பெறப்படுகிறது.

- **வேலைகள்:** நயாசினின் இரண்டு துணை நொதிகளான நிக்கோட்டினமைட் அடினின் டை நியூக்ளியோடைடு (NAD), மற்றும் நிக்கோட்டினமைட் அடினின் டை நியூக்ளியோ டைடு பாஸ்பேட் (NADP) ஆகியவை பின்வருவனவற்றிற்கு தேவைப்படுகிறது:
- சக்தி தரக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களான கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்புச்சத்து போன்ற அனைத்திலிருந்தும் சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது.
- தோல், குடல்பாதை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் இயல்பான பணிகளுக்கு இவை உதவுகிறது.
- DNA மற்றும் RNA உருவாக்கத்திற்காக புரதச்சத்தும் மற்றும் கொழுப்புச்சத்துடன் கூட்டுவினையாற்றுகிறது.

நயாசின் உணவு ஆதாரங்கள்: முழுதானியங்கள், பயறுகள், பருப்புகள் மற்றும் இறைச்சி ஆகியவை நயாசின் உயிர்ச்சத்துக்கு நல்ல ஆதாரங்களாகும். நிலக்கடலையில் அதிகமான நயாசின் உள்ளது. பால், உடலில் உள்ள நயாசினின் முன்பொருளான டிரிப்டோபென் நிறைந்தது.



குறைநோய்கள்: நயாசின் குறைவினால் பெல்லாகரா என்ற நோய் ஏற்படுகிறது. இது 3D நோயானது [வயிற்றுப்போக்கு (Diarrhoea), தோல் அழற்சி (Dermatitis), மனச்சோர்வு அல்லது மறதி நோய் (dementia (or) depression)] நான்காவது D ஆன மரணத்திற்கு (Death) வழிவகுக்கிறது.



சோளம் லூசின் நிறைந்தது மற்றும் டிரிப்டேபென் குறைவாக உடையது

Chapter 05.indd 24 18-01-2019 15:46:45