சைவ உணவு உண்பவர்கள் இறைச்சி உணவிற்கு மாற்றாக மென்மையான காய்கறி புரதத்தினைப் (சோயா புரதம்) பயன்படுத்தலாம்.

போலிக் அமிலம், டிராயில் குளூட்டமிக் அமிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இச்சத்து குறைபாடு மேக்ரோசைடிக் அனீமியாவை ஏற்படுத்துகிறது.

6.2 வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பல்வேறு நிலைகளில் தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துக்கள்

6.2.1 குழவிகளின் ஊட்டச்சத்து தேவைகள்

குழந்தைப்பருவம் என்பது வேகமான வளர்ச்சிக்கான பருவமாகும். ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் வளர்ச்சி மற்ற பருவத்தில் ஏற்படுவதைவிட விரைவானதாக இருக்கும்.

வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம்

வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் என்பது பல உடலியல் மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது ஆகும். அவையாவன: உடல் பரிமாணங்களில் ஏற்படும் மாற்றம், உடல் ஆக்கப்பொருட்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், உணவுக் குழாய் மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், கழிவு நீக்கு மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆகியவை ஆகும். ஊட்டச்சத்து மற்றும் சரியான உணவு மாற்றங்களும் இந்த காலத்தில் முக்கியமானதாகும்.

நோய் தடுப்பூசி

குழவிப் பருவத்தில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்துக் குறைவு, அதிக அளவு சிசு மரண விகிதம் (infant mortality) ஏற்பட வழிவகுக்கிறது. ஊட்டச்சத்து குறைவுத்தவிர அதனுடன் வேறுபிற காரணங்களும் சேர்ந்து மரணத்தை

அட்டவணை 6 குழவிகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான நோய்தடுப்பூசி அட்டவணை

வயது	தடுப்பூசி
பிறந்த உடன்	ஹெப்படைட்டிஸ் B – முதல் முறை, OPV – முதல் முறை, BCG
6 வாரங்கள்	ஹெப்படைட்டிஸ் B – இரண்டாவது முறை, DPT – முதல் முறை OPV – இரண்டாவது முறை
10 வாரங்கள்	DPT– இரண்டாவது முறை, OPV – மூன்றாவது முறை
14 வாரங்கள்	DPT – மூன்றாவது முறை, OPV – நான்காவது முறை
6 மாதங்கள்	OPV – ஐந்தாவது முறை, ஹெப்படைட்டிஸ் B – மூன்றாவது முறை
9 மாதங்கள்	தட்டம்மை தடுப்பூசி
15 முதல் 18 மாதங்கள்	MMR
18 மாதங்கள்	DPT, OPV – முதல் பூஸ்டர்
2 ஆண்டுகள்	டைபாய்டு தடுப்பூசி
5 ஆண்டுகள்	DPT, OPV – இரண்டாவது பூஸ்டர்

DPT – டிப்தீரியா, பெர்ட்டுஸிஸ், டெட்டனஸ், OPV – போலியோ சொட்டுமருந்து; MMR – தட்டம்மை, பொன்னுக்கு வீங்கி, ரூபெல்லா

ஆதாரம்: https://mohfw.gokin/sites/default/files/24545352106148966387 3.pdf

Chapter 06.indd 11 18-01-2019 16:18:38