உயிர்ச்சத்து C

தாய்ப்பால் மற்றும் குழந்தை உணவுகள் ஆகியன உயிர்ச்சத்து "C" கிடைக்கும் முதன்மை உணவு ஆதாரங்கள் ஆகும். உயிர்ச்சத்து "C" கிடைக்கும் கூடுதல் ஆதாரங்கள் காய்கறிகள் (எ.கா. தக்காளிகள்), பழங்கள் (எ.கா.சிட்ரஸ் பழங்கள், பப்பாளி மற்றும் ஸ்ட்ரா பெரிகள்) மற்றும் வழக்கமான பழங்கள் மற்றும் காய்கறி சாறுகளில் இயல்பாகவே அதிகமான அல்லது செறிவூட்டப்பட்ட உயிர்ச்சத்து "C" உள்ளது.

உயிர்ச்சத்து B_{12}

குழந்தை பிறப்பின்போது சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் உயிர்ச்சத்து B_{12} பொதுவாக ஏறக்குறைய 8 மாதங்கள் வரை குழந்தையின் தேவைக்கு கிடைக்கிறது. போதுமான B_{12} கொண்ட தாய்ப்பால் அல்லது குழந்தை உணவைத் தக்க அளவு நுகரும் குழந்தைகள் போதுமான அளவு உயிர்ச்சத்தினைப் பெறுகின்றனர். முதன்மை உணவான இறைச்சி, முட்டையின் மஞ்சள் கரு, மற்றும் பால் பொருட்கள் போன்றவை உயிர்ச்சத்து E யினை குழவி பருவத்தின் இறுதியிலும் வழங்குகின்றன.

கால்சியம்

ஒரு குழந்தை போதுமான அளவு கால்சியத்தை தாய்ப்பால் அல்லது குழந்தை உணவை நுகர்வதன் மூலம் பெறுகின்றது. வளர்ந்த குழந்தைகள் கூடுதல் கால்சியத்தை முதன்மை உணவான, சுவையூட்டப்பட்ட தயிர், பாலாடைக்கட்டி, பன்னீர், செறிவூட்டப்பட்ட தானியப் பொருட்கள், சில பச்சை இலைக் காய்கறிகள் (கிழங்கு வகை மற்றும் கீரை போன்றவை) மற்றும் டோஃபு ஆகியவற்றிலிருந்து பெறுகின்றன.

இரும்புச் சத்து

தாய்ப்பால், குழந்தை உணவு இறைச்சி, ஈரல், பருப்பு வகைகள், முழு தானியங்கள் ரொட்டிகள், தானியங்கள் அல்லது செறிவூட்டப்பட்ட தானியப் பொருட்கள் மற்றும் பச்சை நிறகாய்கறிகள் ஆகியன இரும்புச்சத்தை வழங்கும் ஆதாரங்களாகும். ஹீம் இரும்பு, முதன்மையான சிகப்பு இறைச்சி, ஈரல், கோழி இறைச்சி, மீன் போன்ற விலங்கு திசுக்களில் காணப்படுகிறது. ஹீம் இல்லா இரும்பு தாய்ப்பால், தானியப்பொருட்கள், பருப்புகள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் காணப்படுகின்றது. குழந்தைகள் பெரும்பாலும் ஹீம் இல்லா இரும்பாகவே உணவிலிருந்து பெறுகின்றனர்.

டோஃபு என்பது சோயாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகழ் பெற்ற உணவாகும். இது சீன உணவின் பிரதானமான மூலப்பொருள் ஆகும். மேலும் இது புரதத்தின் நல்ல ஆதாரமாகும் மற்றும் இன்றியமையாத எல்லா எட்டு அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது இரும்பு, கால்சியம், மாங்கனீஸ், செலினியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகிய தாது உப்புகளின் சிறந்த ஆதாரமாக உள்ளது.

துத்தநாகம்

குழந்தைகள் துத்தநாகத்தைத் தாய்ப்பால், குழந்தை உணவு, இறைச்சி, கோழி இறைச்சி, ஈரல், முட்டையின் மஞ்சள் கரு, பாலாடைக்கட்டி, சுவையூட்டப்பட்ட தயிர், பருப்புகள், மற்றும் முழு தானிய ரொட்டிகள், தானியங்கள் மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட தானியப்பொருட்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறுகின்றனர்.

சோடியம்

ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் முதன்மையாகத் தாய்ப்பால் அல்லது நிலையான நீர்த்ததன்மை கொண்ட குழந்தை உணவை நுகர்கிவதால். இதனால் குறிப்பிட்டளவில் சிறிய அளவு சோடியத்தைப் பெறுகின்றனர். ஆனால், இது வளர்ச்சிக்குப் போதுமான அளவாகும்.

நார்ச்சத்து

தாய்ப்பாலில் நார்ச்சத்து இல்லை. முதல் ஆறு மாதங்கள் வரை குழந்தைகள் பொதுவாக நார்ச்சத்தைப் பெறமாட்டார்கள். உணவில்

Chapter 06.indd 13 18-01-2019 16:18:39