6.3 முன்பள்ளி பருவ மற்றும் பள்ளிப் பருவ குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து தேவைகள்

ஒரு வயது வரை வேகமாக வளரும் குழந்தையின் வளர்ச்சி 1-6 வயதில் மெதுவாக குறையத் தொடங்குகிறது. ஆனால் இவ்வயதுப் பருவத்தில் குழந்தைகள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். அவர்கள் வளரும் சமுதாயம் மற்றும் சூழலைப் பொருத்து அவர்களது உணவுப் பழக்கங்கள் அமைகிறது. குழந்தைகள் வளர வளர, அவர்களது ஊட்டச்சத்து தேவையும் அதிகரிக்கிறது.

வளர்ச்சியோடு இணைந்த மாற்றங்கள்

குழந்தையின் இரண்டாவது வயதில் உயரம் 10 சென்டிமீட்டரும், எடை 2-2.5 கி.கி அதிகரிக்கிறது. இதற்குப்பின், குழந்தைகளின் வளர்ச்சி விகிதம் சற்று குறைகிறது. அதாவது, ஆண்டிற்கு 6-7 சென்டி மீட்டர் உயரமும், 1.5-2 கி.கி எடையும் மட்டுமே அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும், குழந்தைகளிடையே உடலியக்க முன்னேற்றத்தில் அதிக அளவு வித்தியாசம் காணப்படுகிறது.

குழந்தை வளரும் போது உடலின் நீர், தசைத்திசுக்கள், கொழுப்புச்சத்து படிதல் மற்றும் எலும்பு மண்டல வடிவத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. அதாவது குழந்தைகளின் உடலில் நீரின் அளவு குறைந்து, கொழுப்புத் திசுக்களின் அளவு அதிகரிக்கிறது. மேலும், தாது உப்புக்கள், எலும்புகளில் படிவதும் அதிகரிக்கிறது.

முன்பள்ளி பருவத்தினருக்கான ஊட்டச்சத்து தேவைகள்

சக்தி

குழந்தையின் சக்தி தேவைகள், அடிப்படை வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் செயல்பாட்டின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. முன்பள்ளி பருவக் குழந்தைக்கு சீரான முதன்மை உணவுகள் மற்றும் துணை உணவுகள் வழங்கப்படவில்லை என்றால், அது புரதக்கலோரி நோயை ஏற்படுத்தலாம்.

புரதம்

முன்பள்ளி பருவத்தினரின் வளர்ச்சிக்கு புரதம் தேவையாக இருப்பதால், இது முக்கிய உணவுப் பொருளாக விளங்குகிறது. முறையான வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு போதுமான அளவு புரதம் உட்கொள்ள வேண்டும்.

கொழுப்பு

கூடுதல் கலோரிகளை வழங்குவதற்கும் உணவில் பெரும்பகுதி குறைவதற்கும் போதுமான கொழுப்பு தேவைப்படுகிறது.

தாது உப்புக்கள்

எலும்பு மற்றும் பற்களுக்கு கனிமப்படுத்தல் (mineralization) மற்றும் பராமரிப்பிற்கு கால்சியம் தேவைப்படுகிறது. ஒரு குழந்தைக்குத் தேவையான கால்சியத்தின் அளவு புரதம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் உயிர்ச்சத்து D போன்ற மற்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் உட்கொள்வதையும் குழந்தையின் வளர்ச்சி விகிதத்தையும் பொறுத்துத் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. குழந்தைப்பருவத்தில் வளர்ச்சிக்கும் ஹீமோகுளோபின் அடர்த்தி அதிகரிப்பதற்கும் இரும்புச்சத்து தேவைப்படுகிறது. கொக்கிப்புழுத் தொற்று மற்றும் உணவில் இரும்புச்சத்து பற்றாக்குறை ஆகியன சேர்ந்து இரத்த சோகையை ஏற்படுத்தும்.

இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் குழந்தைகள் மற்றும் பிற வயதினருக்கு 30% - 50% இரத்த சோகை ஏற்படுகிறது (WHO 2007).

துத்தநாகம், முறையான வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகிறது. இது காயம் ஆறுவதற்கும், சுவையை உணர்வதற்கும், முறையான வளர்ச்சி மற்றும் இயல்பாக பசி ஏற்படுவதற்கும் தேவைப்படுகிறது.

உயிர்ச்சத்துகள்

உயிர்ச்சத்து A குறைபாடு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட B கூட்டு உயிர்ச்சத்துகளின் அளவானது சக்தி

Chapter 06.indd 20 18-01-2019 16:18:44