- உணவு தாளிதம் செய்ய வேண்டும். அதனால் அதன் சுவை மேம்படும் மேலும், குழந்தைகள் விரும்பி உண்பார்கள்.
- பொறித்த மற்றும் செறிவான உணவுகள் செரிமானத்தை கடினமாக்கும் அதனால் கொடுக்கக்கூடாது.
- குழந்தை உண்ணும் அளவை விட அதிகமாக உண்ண வற்புறுத்தப்படக் கூடாது.
- உண்ணும்போது குழந்தையை வற்புறுத்தவோ அவசரப்படுத்தவோ கூடாது. சூழ்நிலை அமைதியானதாகவும், இனிமையானதாகவும், கவனச்சிதறல் குறைவானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- குழந்தைகளுக்கு உணவு ஊட்டுபவர் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அவ்வுணவின் மீதுள்ள விருப்பமின்மையை காட்டக்கூடாது, இது குழந்தை உணவை நிராகரிக்க வழிவகுக்கும்.
- உணவில் ஒழுங்குமுறை இருத்தல் அவசியமானது.
- குழந்தைகளின் உணவு விருப்பங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

முன்பள்ளி பருவத்தினரிடையே ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள்

புரதசக்தி ஊட்டக்குறைவு (PEM)


ஊட்டச்சத்துக் குறைவுக்கு தவறான உணவுப்பழக்கம் மற்றும் உணவு பற்றாக்குறையுமே முதன்மையான காரணமாகும். உணவு மற்றும் சமூக பொருளாதார காரணிகள் தவிர, பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் உணவு பற்றாக்குறையை அதிகப்படுத்துகின்றன. இதில் அடங்கும் காரணங்களாவன: நீண்டகால தொற்று, சுற்றுப்புற சுகாதாரக் குறைவு, சுகாதாரமற்ற வாழ்க்கை நிலை, தனிநபர் சுத்தம் இல்லாதிருத்தல்.

PEM ன் தீவிர வடிவத்தை பிரதிபலிக்கும் நோய்களாவன:


i. சவலை நோய் (kwashiorkor)
ii. நோஞ்சான் (marasmus)
iii. நோஞ்சான் சவலை (marasmic kwashiorkor)

உயிர்ச்சத்து A குறைபாடு

போதுமான அளவு உயிர்ச்சத்து A அல்லது அதன் முன் காரணியான β-கரோட்டின் நிறைந்த உணவை உட்கொள்ளாததே உயிர்ச்சத்து A குறைபாட்டிற்கு காரணமாகும். உயிர்ச்சத்து A குறைபாட்டால் ஏற்படும் பைடாட் புள்ளிகள், கெரட்டோ மலேசியா போன்றவை முன் பள்ளிப் பருவக் குழந்தைகளிடத்தில் காணப்படுகிறது.



▲ படம் 2 பைடாட் புள்ளிகள்



▲ படம் 3 கெரட்டோ மலேசியா

பள்ளிபருவ குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துக்கள் (6-12 வயது)

Chapter 06.indd 22 18-01-2019 16:18:45