- ஆறுமுதல் பன்னிரண்டு வயதுவரையுள்ள குழந்தைகளின் வளர்ச்சியானது அதிக மாற்றமின்றி, ஒரே சீராக இருக்கும்.
- வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து உடற் மாற்றங்கள் படிப்படியாக ஏற்படும். இக்காலத்தில் ஏற்படும் மெதுவான வளர்ச்சி விகிதத்தால், உடல் எடையின் ஒரு அலகிற்கான உணவுத்தேவை படிப்படியாக குறைகிறது.

சக்தி

சக்தி தேவையானது வளர்ச்சி விகிதம், உடல் அளவு மற்றும் உடலியல் செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு வேறுபடுகிறது. பள்ளிப் பருவத்தில் கலோரி தேவைகள் அதிகரிக்கும்.

புரதம்

பெண்கள் பூப்படையும் நிலையை அடைவதால், ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக புரதம் தேவைப்படுகிறது. 10-12 வயதுள்ள ஆண்களைவிட பெண்களுக்கு புரதத் தேவை சற்று அதிகரிக்கிறது.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

கொழுப்பேற்ற மீட்சி (adiposity rebound) என்பது சாதாரண வளர்ச்சியின் ஒரு நிகழ்வு ஆகும். ஆறு வயதில் ஒரு குழந்தையின் உடல் கொழுப்பு அதிகரிக்கும் போது இது ஏற்படுகிறது.

தாது உப்புக்கள்

எலும்பு வளர்ச்சியை ஈடுசெய்ய கால்சியம் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் 2-3 குவளைகள் பால் அருந்த வேண்டும். ஹீமோகுளோபின் அடர்த்தி உயர்வதால் இரும்பு சத்து தேவை மேலும் அதிகரிக்கிறது.

உயிர்ச்சத்துகள்

குழந்தைகளுக்கான உயிர்ச்சத்து A யின் தேவைகள் 600 மை.கி ஆகும். உயிர்ச்சத்து தேவைகள் 40 மிகி. கலோரி தேவைகளுடன் B கூட்டு உயிர்ச்சத்துகளின் தேவையும் அதிகரிக்கிறது. பெரியவர்களுக்கான RDA

அட்டவணை 10 பள்ளிச்செல்லும் குழந்தைகளுக்கான சரிவிகித உணவு

உணவு தொகுதிகள்	கி/பங்கு	7–9 வயது	அளவு (கி) 10–12 வயது	
			ஆண்கள்	பெண்கள்
தானியங்கள் மற்றும் சிறு தானியங்கள்	30	6	8	10
பருப்புகள்	30	2	2	2
பால் (மி.லி)	100	5	5	5
மண்ணுக்கடியில் விளைவன மற்றும் கிழங்குகள்	100	1	1	1
பச்சை இலைக் காய்கறிகள்	100	1	1	1
மற்ற காய்கறிகள்	100	1	2	2
பழங்கள்	100	1	1	1
சர்க்கரை	5	4	6	6
கொழுப்புகள்/எண்ணெய்கள்	5	6	7	7

ஆதாரம்: இந்தியர்களுக்கான உணவுத்திட்ட வழிகாட்டுதல்கள் ஒரு கையேடு, தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம், ICMR, ஹைதராபாத், இந்தியா (2011)

Chapter 06.indd 23 18-01-2019 16:18:46