6.6 நடுத்தர வயதினருக்கான ஊட்டச்சத்து தேவைகள்

ஒரு தனிநபர் நடுத்தர வயதினர் என்ற நிலையை அடையும் போது, அவருடைய உடலின் வளர்ச்சி, முக்கியமாக உயர வளர்ச்சி ஓரளவிற்கு நின்று விடுகிறது. ஆனால் திசு சிதைவடைதலும், திசுக்களைப் பழுது பார்த்தலும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டேயிருக்கிறது. எனவே உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிப்பதற்கு தேவையான அளவு ஊட்டச்சத்துக்களை அளித்திடல் வேண்டும்.

சக்தி / கிலோ கலோரி

நடுத்தர வயதினருக்கு உடல் செல்களின் வேலைகள் படிப்படியாகக் குறையும் மற்றும் உடல் செயல்பாடும் குறையும் எனவே நடுத்தர வயதினருக்கு பொதுவாக குறைந்த சக்தியே தேவையாக இருக்கும். இந்த சக்தியை வழங்கும் அடிப்படை பொருட்கள் முதன்மையான கார்போஹைட்ரேட்டுகளுடன் மிதமான கொழுப்புகள் ஆகும்.

புரதம்

நடுத்தர வயதினருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து அளவுகளில் சொல்லப்பட்ட உடல் எடையில் 0.8 கி/கி.கி புரதமே மொத்த புரதமாகிறது. இந்த புரதம் மொத்த கலோரிகளில் 13–15% வழங்குகிறது.

கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

மொத்த கலோரிகளில் 50-60% த்திற்கும் மேற்பட்டவை கார்போஹைட்ரேட்டு உணவுகளில் இருந்து பெறவேண்டும். இவை பெரும்பாலும் ஸ்டார்ச் போன்ற கார்போஹைட்ரேட்டு கலவைகளாக இருக்கும். எளிதில் உறிஞ்சப்படுகிற சர்க்கரை உடனடி ஆற்றலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கொழுப்பு

இது மீண்டும் மீண்டும் சக்தி ஆதாரத்தை வழங்குகிறது. போதுமான கொழுப்பு உணவின் சுவையை மேம்படுத்துகிறது. பசியின்மைக்கு உதவுகிறது மற்றும் கூடுதலாக எடை குறையாமல் தடுப்பதற்கு தேவையான கிலோ கலோரிகளை வழங்குகிறது.

கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ்:

நடுத்தர வயதினருக்கு சிறுநீர், மலம், வியர்வை மற்றும் பித்த நீர் வழியாக ஏற்படும் கால்சியம் இழப்பினை ஈடுசெய்வதற்கு கால்சியம் தேவைப்படுகிறது. உணவில் உள்ள கால்சியம் 20-30% மட்டுமே உறிஞ்சப்படுகிறது. இது உயிர்ச்சத்து D-ஆல் எளிதாக்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட அளவு பாஸ்பரஸ் உட்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. உணவில் உள்ள அடிப்படை கால்சியம்:பாஸ்பரஸ் விகிதம் 1:1 ஆக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

இரும்பு

வியர்வை, இரைப்பைப்பாதை, சிறுநீர் வழியாக ஏற்படும் இரும்பு சத்து இழப்பு உடல் எடையில் 14 மி.கி/கி.கி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை தவிர பெண்களுக்குக் கூடுதல் இழப்பு மாதவிடாயின் போது ஏற்படுகிறது. இதனால், ஆண்களைவிட பெண்களுக்கு இரும்புசத்து தேவை அதிகமாகவுள்ளது.

உயிர்ச்சத்துக்கள்

தினமும் 600 மிகி ரெட்டினால், இயல்பான உயிர்ச்சத்து A யின் அளவை பராமரிக்கப்போதுமானது என ஆய்வுகள் வெளியிட்டுள்ளன. கலோரி உட்கொள்வதன் அடிப்படையில் உயிர்ச்சத்து B தேவைப்படுகிறது. இந்தியர்களுக்கு தேவைப்படும் போலிக் அமிலம் 200 மை.கி ஆகும். தினமும் 20 மிகி உயிர்ச்சத்து C உட்கொள்தல் அஸ்கார்பிக் அமில நிலையை பராமரிக்கப் போதுமானது. சமையலின் போது 50 சதவீத உயிர்ச்சத்து C யை இழந்துவிடுவதால், ஒரு நாளைக்கு 40 மிகி உயிர்ச்சத்து C பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Chapter 06.indd 29 18-01-2019 16:18:49